



**Descripció de la varietat**

Interessants qualitats comercials, fins i tot més resistent que la Coll de dama blanca? però no tant coneguda al mercat.

**Usos i coneixements**

Consum humà  
Consum en fresc.

**Caràcters morfològics de la varietat**

Fenologia	
Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figues tardanes
Inici de la maduració	Molt tardana (>31 d'agost) (1 de setembre)
Plena maduresa de les figues	Tardana (1-30 de setembre) (15-23 de setembre)
Període de collita (dies)	Llarg (41-60 dies) (41)

Arbre i ramificació	
Hàbit de creixement	Obert
Vigor	Mitjà
Ramificació	Dominància apical absent, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Mitjana
Forma del borro terminal	Cònica
Color del borro terminal	Groc
Llargària dels brots (cm)	Mitjana (11-20 cm) (10-15)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (9,3)
Color dels brots	Marró
Tendència a emetre tanyades	Molt poca
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

Fulla	
Nombre de fulles/brot	6,5
Nombre de lòbuls	Pentalobades (70%) i trilobades (30%)
Amplada de la fulla (cm)	16
Llargària de la fulla (cm)	18
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Serrat
Sinus peciolar	90° - 100°
Densitat de pèls a l'envers	
Llargària del pecíol (cm)	Mitjana (5-8 cm) (5,3)
Diàmetre del pecíol (mm)	5,9
Secció del pecíol	Redona
Color del pecíol	Verd groguenc

Fruit	
Forma segons la situació del diàmetre màxim	Aperada
Forma (l= amplada/llargària)	Allargada o el·líptica transversal (l < 0,9) (0,75 - 0,82)
Percentatge de siconis emparellats (%)	20 - 25
Pes (g)	34,8
Amplada del fruit (mm)	Ampla (50-60) (45)

Llargària del fruit (mm)	Llarga (52-70) (55-60)
Uniformitat de les dimensions	Uniforme
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostíol (mm)	1-3
Gota a l'ull	Absent
Grandària de les esquames	Petita
Color de les esquames	Morat
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	1- 2
Formacions anormals (%)	0
Abscisió del peduncle	Fàcil
Facilitat de pelada	Molta
Costelles	Prominents
Clivells	Presentes
Gruix de l'epidermis (mm)	0,5-0,8
Textura de l'epidermis	Mitjana
Color de fons de l'epidermis	Negre/morat
Color de l'albedo	Clar
Color de la polpa	Vermell
Cavitat interna	Petita
Quantitat d'aquenís	Pocs
Sabor	Excel·lent


### Característiques de les figues seques

Color	Fosc
Període d'assecament	Mitjà (8-14 dies) (7-14)

### Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	4,7
Rendiment per arbre	Mitjà
Resistència al transport	Alta
Resistència a agrit	Resistent
Resistència a badament	Molt resistent
Resistència a plagues/malalties/fongs	resistent a Ceratitis

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Rosselló, J. 	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca
Llibres i altres monografies	Pons, M.	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana
Llibres i altres monografies	Estelrich, P.	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)