

VARIETATS LOCALS DE GARROVER



G CONSELLERIA
O AGRICULTURA,
I PESCA I ALIMENTACIÓ
B INSTITUT RECERCA
/ I FORMACIÓ
AGROALIMENTÀRIA
I PESQUERA
ILLES BALEARS

*Selecció de les varietats de garrover
més reconegudes d'una col·lecció de més de
40 varietats preservades per l'IRFAP*



VARIETATS LOCALS DE GARROVER

«Els garrovers de Mallorca són de molt bona qualitat; les varietats més corrents són les de durrelló, de costella, rosses i de mel».²

«Bon arbre és es garrover que fa garroves tot l'any, quan li cuïen ses d'enguany, ja té ses de l'any qui ve».³



LLEGENDA:



Llargària de la beina

Petita (< 14 cm)

Mitjana ($14 - 18$ cm)

Grossa (> 18 cm)



Pes de la beina

Petita (< 12 g)

Mitjana ($12 - 17$ g)

Grossa (> 17 g)



Rendiment del garroví

Baix ($< 10\%$)

Mitjà ($10 - 15\%$)

Alt ($> 15\%$)



Pes del garroví

Petit ($< 0,17$ g)

Mitjà ($0,17 - 0,20$ g)

Gros ($> 0,20$ g)



Arbre de flors femenines



Arbre de flors hermafrodites

La proporció de mides entre les varietats no s'ajusta a la real.



BAJOCA



18,54 cm



18,40 g



9,67%



0,21 g

Arbre de vigor mitjà i port obert, amb una densitat foliar intermèdia. Fulles amb nombre mitjà de foliols.

Beina de forma corbada amb superfície rugosa i color marró. Garrovins de forma ovalada i superfície llisa.



BOVAL



17,23 cm



16,08 g



8,05%



0,18 g

Localització: Sant Carles, Sant Antoni (Eivissa).⁵

Arbre de vigor baix-mitjà i port erecte, amb una densitat foliar que va d'intermèdia a densa. Fulles amb pocs folíols.

Beina de forma molt corbada amb superfície molt rugosa i color marró. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.

«Es fa gros i té la garrova negra i fina».¹



BUGADERA

Sinonímia: Llucmajorera



17,93 cm



14,27 g



15,40%



0,20 g

Localització: Artà, Porreres, Felanitx, Son Servera (Mallorca).⁵

Arbre de vigor mitjà i port obert, amb una densitat foliar que va d'intermèdia a densa. Fulles amb nombre mitjà de folíols.

Beina de forma corbada amb superfície molt rugosa i color marró obscur. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.

Descrita com una varietat «de bones característiques agronòmiques». ⁵ «Fruit més llenyós i menys ensucrat». ⁴ «Mitjancera, llargaruda, molt bona per al bestiar». «És una de les varietats més esteses». ⁵



CAPOLL CURT



13,43 cm



9,91 g



17,43%



0,20 g

Arbre de vigor mitjà i port obert. Fulles curtes amb nombre mitjà de foliols.

Beina de forma corbada amb superfície molt rugosa i color marró. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.

Descrita com «curteta, gruixadeta, bona; ve devers l'octubre».¹ «Fruit de peduncle curt i molt ensucrat».⁴ «No qualla bé en climes freds».⁴ «Presència testimonial».⁵



D'EN PAU



16,04 cm



15,66 g



13,57%



0,21 g

Localització: Santa Maria (Mallorca).⁵

Arbre de vigor alt i port obert, amb una densitat foliar intermèdia. Fulles amb nombre mitjà de folíols.

Beina de forma recta amb superfície molt rugosa i color marró. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.

«Bones característiques agronòmiques i comercials».⁵



DE LA MEL



14,58 cm



12,75 g



12,03%



0,20 g

Localització: Calvià, Palma, Campanet, Lluçmajor (Mallorca).⁵

Arbre de vigor mitjà, creixement ràpid i port obert, amb una densitat foliar poc densa. Fulles amb pocs folíols curts, ovoides i de color verd intens.

Beina de forma recta amb superfície molt rugosa i color marró-negre. Garrovins de forma ovalada i superfície molt rugosa.

Descrita com «curteta i gruixada, amb més suc i més molla que l'ordinària».¹ «Polpa ensucrada. Fins i tot les abelles el cerquen per extreure una mel exquisida».⁴ «Molt sensible a les baixes temperatures».⁴



DES MESTRE



19,88 cm



18,01 g



9,45%



0,18 g

Localització: Campos (Mallorca).⁵

Arbre molt precoç a l'entrada en producció, de vigor alt i port obert, amb una densitat foliar intermèdia. Fulles amb nombre mitjà de folíols i raquis vermell.

Beina de forma corbada amb superfície rugosa i color marró-negre. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.

«Varietat pròpia dels termes de Campos, Santanyí i ses Salines, on és molt apreciada».⁴



DURAIÓ

Sinonímia: Duraiona



16,44 cm



14,18 g



12,98%



0,19 g

Localització: Santa Maria, Alaró, Mancor, Selva (Mallorca).⁵

Arbre de vigor mitjà i port obert, amb una densitat foliar intermèdia. Fulles amb nombre mitjà de folíols llargs i de color verd suau.

Beina de forma recta amb superfície rugosa i color marró. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.

Classificada com «un dels quatre cultivars més importants de Mallorca». ⁵ «Estreta, gropelluda i un poc vermellosa». ¹ «Garrova de peduncle llarg i molt ensucrada». ⁴ «No qualla bé en climes freds». ⁴



FINA



12,96 cm



15,86 g



9,05%



0,21 g

Localització: Sant Carles, Sant Antoni (Eivissa).⁵

Arbre de vigor baix i port obert, amb una densitat foliar que va d'intermèdia a densa. Fulles amb nombre mitjà de folíols.

Beina de forma corbada amb superfície molt rugosa i color marró-negre. Garrovins de forma ovalada i superfície llisa.



LLOSETA



17,72 cm



21,13 g



9,79%



0,20 g

Localització: Lloseta (Mallorca).⁵

Arbre de precoç entrada en producció i d'elevada productivitat. Té un vigor alt i un port erecte, amb una densitat foliar intermèdia. Fulles amb nombre mitjà de folíols.

Beina de forma corbada amb superfície rugosa i color negre. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.



ORELLONA

Sinonímia: Uraiona



16,99 cm



15,57 g



13,96%



0,19 g

Localització: Sant Josep, Sant Antoni (Eivissa).⁵

Arbre de vigor mitjà i port obert, amb una densitat foliar poc densa. Fulles amb nombre mitjà de foliols.

Beina de forma corbada amb superfície molt rugosa i color negre. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.



ROJA D'EIVISSA



13,31 cm



12,39 g



12,05%



0,17 g

Localització: Santa Gertrudis (Eivissa).⁵

Arbre de vigor alt i port erecte, amb una densitat foliar intermèdia. Fulles amb nombre mitjà de folíols.

Beina de forma corbada amb superfície molt rugosa i color marró. Garrovins de forma ovalada i superfície molt rugosa.



SA LLEBRE



16,97 cm



16,68 g



10,10%



0,18 g

Arbre d'entrada en producció precoç i d'elevada productivitat, de vigor baix-mitjà i port obert, amb una densa densitat foliar. Fulles amb nombre mitjà de folíols.

Beina de forma recta amb superfície rugosa i color marró. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.



GRANJA



14,10 cm



9,35 g



19,54%



0,20 g

Arbre de vigor mitjà-alt i port ploraner, amb una densitat foliar que va de poc densa a intermèdia. Fulles amb nombre mitjà de folíols.

Beina de forma recta amb superfície molt rugosa i color marró. Garrovins de forma ovalada i superfície llisa.

*Varietat no tradicional, obtinguda per selecció de pol·linització lliure dels programes d'experimentació de l'IRFAP.



H2-12 (E-13P)



15,92 cm



11,63 g



16,41%



0,21 g

Arbre de precoç entrada en producció i d'elevada productivitat, de vigor mitjà i port erecte, amb una densitat foliar que va d'intermèdia a densa. Fulles amb nombre mitjà de folíols.

Beina de forma corbada amb superfície molt rugosa i color marró. Garrovins de forma ovalada i superfície rugosa.

*Varietat no tradicional, obtinguda per selecció de pol·linització lliure dels programes d'experimentació de l'IRFAP.



REFERÈNCIES:

Recopil·lació feta per: Suau, T. (2016). «Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes».

- ¹ Alcover, A. M. i Moll, F. de B. (1930-1962). *Diccionari català - valencià - balear* (DCVB). Editorial Moll.
- ² Augsburg, A. Ll. S. (1871). *Die Balearen*. Volum III, Primera Part. Edició de Caixa de Balears Sa Nostra, dirigida per Isabel Moll Blanes (1987). Palma.
- ³ Peña, A. M. (1896). *Cançons populars mallorquines*. Tipografia Catòlica Balear de Sanjuan, germans.
- ⁴ Rullán, J. (1881). *Memoria sobre el algarrobo y su cultivo en Mallorca*. Imprenta y librería de Pedro José Gelabert.
- ⁵ Tous, J., Batlle, I., Rallo, J. i Romero, A. (2006). *Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares*. Conselleria d'Agricultura i Pesca. Govern de les Illes Balears.

