



Descripció de la varietat

L'albercoc lluentó o lluent és citat per l'arxiduc com "dels més comuns. Destaquen per la seva qualitat" (Ausburg, 1871)*. Es tracta d'un albercoc de mida mitjana, color ataronjat clar, de forma obliqua ròmbica, i color crema a l'interior. La fulla de l'arbre és grossa, amb més de tres nectaris.

*Extret de Suau, T. Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears. 2016.

Origen de la varietat

Actualment se'n troben tres exemplars a la col·lecció de fruiters de sa Canova.

Usos i coneixements

Consum humà

Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació

| | |
|-------|-----------|
| Vigor | Mitjà |
| Port | Divergent |

Fulla

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Llargària | Llarga (86,89 ± 6,78) |
| Amplada | Ampla (86,86 ± 6,82) |
| Relació llargària/amplada | 1,00 |
| Forma de la base | Cordiforme |
| Incisions de la vora | Biserrades |
| Llargària del peciol | Curta (33,79 ± 3,38) |
| Nombre predominant de nectaris | Més de tres |

Fruit

| | |
|----------------------------------------|------------------------|
| Diàmetre (mm) | Mitjana (44,15 ± 2,93) |
| Forma (vista ventral) | Ovada |
| Forma (vista lateral) | Ròmbic oblic |
| Color del fons de l'epidermis | Ataronjat clar |
| Color de la polpa | Crema |
| Proporció de color sobreposat | Mitjana |
| Llavor en vista lateral | Circular |
| Relació pes del fruit/pes de la llavor | Gran (25,61) |
| Adherència del pinyol a la polpa | Mitjana |
| Profunditat de la cavitat peduncular | Profunda (7,60 ± 0,67) |
| Superfície | Abonyegada |
| Forma de l'àpex | Truncada |
| Sutura | Lleugerament enfonsada |
| Simetria (vista ventral) | Clarament asimètrica |

Fenologia

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Inici de la floració | Primerenca (Tercera setmana de febrer) |
| Inici de la maduració | Molt primerenca (Quarta setmana de maig) |

Altres

| | |
|------------------------|--------------|
| Contingut en sucre | 13,80 ± 0,16 |
| Pes (gr) | 45,84 ± 6,71 |
| Rendiment en polpa (%) | 96,10 |
| pH | 3,29 ± 0,08 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Acidesa (grams àcid màlic/l) | 23,67 ± 0,60 |
|------------------------------|--------------|

Acreditació bibliogràfica

| Objecte | Autors | Títol | Editorial |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Llibres i altres monografies | Augsburg, A. Ll. S. | Die Balearen. Tom V. Mallorca. | Edició de Caixa de Balears Sa Nostra, dirigida per Isabel Moll Blanes (1987, Palma) |
| Comunicació d'un congrés | Fornés, J.; Ordinas, A. | "Els noms de les varietats locals d'alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d'Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística. | Universitat de les Illes Balears |
| Informe | Staller Gränicher, M. A. | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016. | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca |
| Informe | Suau, T. | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca |