



Descripció de la varietat

Presenta un caràcter destacable; el gran aguant dels fruits a l'arbre, fins al punt que alguns no arriben a caure i queden com a secalls fins a l'any vinent. A més, una gran part de la collida es perd com a badocs.

Usos i coneixements

Consum animal

Comum per bestiar i sequer.

Caràcters morfològics de la varietat

Fenologia

Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figues agostenques
Inici de la maduració	Tardana (15-31 d'agost) (18 d'agost)
Plena maduresa de les figues	Mitjana (11-31 d'agost) (23-31 d'agost)
Període de collita (dies)	Mitjà (21-40 dies) (35)

Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Obert
Vigor	Elevat
Ramificació	Dominància apical present, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Densa
Forma del berró terminal	Cònica
Color del berró terminal	Groc
Llargària dels brots (cm)	Curta (< 10 cm) (5-7)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (9,2)
Color dels brots	Marró
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

Fulla

Nombre de fulles/brot	5,2
Nombre de lòbuls	Trilobada
Amplada de la fulla (cm)	17,7
Llargària de la fulla (cm)	18,5
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Serrat
Sinus peciolar	Agut (0°-60°)
Densitat de pèls	Escassa al revers
Llargària del peciolar (cm)	5,1
Diàmetre del peciolar (mm)	4,3
Secció del peciolar	Redona
Color del peciolar	Verd groguenc

Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Abaldufada
Forma (l= amplada/llargària)	Globosa o circular (l = 0,9-1,1) (l = 1)
Percentatge de siconis emparellats (%)	8
Pes (g)	20,7
Amplada del fruit (mm)	Petita (28-38) (37)
Llargària del fruit (mm)	Curta (29-46) (37)

Uniformitat de les dimensions	Uniforme
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostíol (mm)	3-5
Gota a l'ull	Absent
Grandària de les esquames	Mitjana
Color de les esquames	Rosat
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	1-3
Formacions anormals	0%
Abscició del peduncle	Difícil
Facilitat de pelada	Poca
Costelles	Poc marcades
Clivells	Reticular
Gruix de l'epidermis (mm)	0,3-0,4
Textura de l'epidermis	Mitjana
Color de fons de l'epidermis	Verd
Color de l'estampat de l'epidermis	Clivellat terrós
Color de l'albedo	Clar (Clar verdós)
Color de la polpa	Vermell
Sabor	fat
Cavitat interna	Absent
Quantitat d'aquenis	Molts

Característiques de les figues seques

Període d'assecamment	Curt (< 7 dies) (7 dies)
Color	Clar

Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	4,4
Rendiment per arbre	Mitjà
Resistència a agrit	Mitjana
Resistència al transport	Baixa

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Rosselló, J.	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca
Llibres i altres monografies	Estelrich, P.	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)
Llibres i altres monografies	Pons, M	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana