



Descripció de la varietat

Les figueres presenten prou varietat de formes i d'aspectes de l'epidermis. Tenen el pecíol de color verd i solen obrir un clivell menut per l'ostíol.

Per la seva productivitat i l'aprofitament mixt s'ha estès molt per l'illa. Estelrich ja l'anomenà "reina de les figueres negres".

Usos i coneixements

Consum humà

Consum en fresc, huma i per bestiar.

Caràcters morfològics de la varietat

Fenologia

Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figues tardanes
Inici de la maduració	Molt tardana (>31 d'agost) (6 de setembre)
Plena maduresa de les figues	Tardana (1-30 de setembre) (15-23 de setembre)
Període de collita (dies)	Mitjà (21-40 dies) (37-43)

Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Obert
Vigor	Elevat
Ramificació	Dominància apical present, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Densa
Forma del borro terminal	Cònica
Color del borro terminal	Verd groguenc
Llargària dels brots (cm)	Curta (< 10 cm) (7-9)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (9,3)
Color dels brots	Marró
Tendència a emetre tanyades	Poca
Data d'abscisió de fulles	5-10 d'octubre
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

Fulla

Nombre de fulles/brot	6
Nombre de lòbuls	Trilobada (75-92%), pentalobada (3-15%) i sencera (5-10%)
Amplada de la fulla (cm)	6,5
Llargària de la fulla (cm)	17,7
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Serrat
Sinus peciolar	180°
Densitat de pèls	Escassa al revers
Llargària del pecíol (cm)	7,6
Diàmetre del pecíol (mm)	4,7
Secció del pecíol	Redona
Color del pecíol	Verd groguenc

Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Abaldufada
Forma (l= amplada/llargària)	Globosa o circular (l = 0,9-1,1) (l = 1-1,07)
Percentatge de siconis emparellats (%)	4

Pes (g)	32,9
Amplada del fruit (mm)	Mitjana (38-49) (45-48)
Llargària del fruit (mm)	Curta (29-46) (45)
Uniformitat de les dimensions	Uniforme
Simetria	Assimètric
Diàmetre de l'ostiol (mm)	1-3
Gota a l'ull	Present
Grandària de les esquames	Petita
Color de les esquames	Vermell
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	2-7
Formacions anormals	1%
Abscició del peduncle	Difícil
Facilitat de pelada	Mitjana
Costelles	Poc marcades
Clivells	Longitudinal escàs
Gruix de l'epidermis (mm)	0,4
Textura de l'epidermis	Mitjana
Color de fons de l'epidermis	Negre/morat
Color de l'albedo	Clar
Color de la polpa	Vermell
Sabor	apreciat, picant no totalment madura
Cavitat interna	Petita
Quantitat d'aquenis	Mitjans

Característiques de les figues seques

Període d'assecamment	Mitjà (7-14 dies) (7-14)
Color	Fosc

Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	3,5
Rendiment per arbre	Elevat
Resistència a badament	Mitjana
Resistència a agrit	Mitjana
Resistència al transport	Baixa

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Pons, M.	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou	Montserrat Pons Boscana
Llibres i altres monografies	Rosselló, J	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca
Llibres i altres monografies	Estelrich, P.	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)