



Descripció de la varietat

Al País Valencià són conegudes diferents cultivars negres amb el nom de ?Napolitana?.

Usos i coneixements

Consum animal

Caràcters morfològics de la varietat

Fenologia

Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figues agostenques
Inici de la maduració	Mitjana (1-15 d'agost) (15 d'agost)
Plena maduresa de les figues	Mitjana (11-31 d'agost) (21 - 29 d'agost)
Període de collita (dies)	Mitjà (21-40 dies) (26)

Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Desmai
Vigor	Mitjà
Ramificació	Dominància apical absent, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Mitjana
Forma del borró terminal	Cònica
Color del borró terminal	Groc
Llargària dels brots (cm)	Mitjana (11-20 cm) (10-15)
Diàmetre dels brots (mm)	Mitjà (11 - 15 cm) (10,1)
Color dels brots	Marró
Tendència a emetre tanyades	Molt poca
Data d'abscisió de fulles	Camí des Palmer, s/n 07609 Lluçmajor
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

Fulla

Nombre de fulles/brot	5,7
Nombre de lòbuls	Trilobada (80%) i pentalobada (20%)
Amplada de la fulla (cm)	17,1
Llargària de la fulla (cm)	18,3
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Serrat
Sinus peciolar	Agut (60°)
Densitat de pèls	Nombrosa al revers
Llargària del peciolar (cm)	Mitjana (5-8 cm) (6,8)
Diàmetre del peciolar (mm)	5,2
Secció del peciolar	Redona
Color del peciolar	Verd groguenc

Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Abaldufada
Forma (l= amplada/llargària)	Globosa o circular (l = 0,9-1,1) (1)
Percentatge de siconis emparellats (%)	10
Pes (g)	30,1
Amplada del fruit (mm)	Mitjana (38-49) (40-45)
Llargària del fruit (mm)	Mitjana (46-54) (40-45)

Uniformitat de les dimensions	Uniforme
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostiol (mm)	3-5
Gota a l'ull	Absent
Grandària de les esquames	Grossa
Color de les esquames	Marró
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	0,2 - 0,6
Formacions anormals	1
Abscició del peduncle	Difícil
Facilitat de pelada	Mitjana
Costelles	Poc marcades
Clivells	Longitudinal escàs
Gruix de l'epidermis (mm)	0,5 - 0,8
Textura de l'epidermis	Mitjana
Color de fons de l'epidermis	Verd groguenc
Color de l'albedo	Clar
Color de la polpa	Ambre
Sabor	aigualit
Cavitat interna	Mitjana
Quantitat d'aquenís	Molts

Característiques de les figues seques

Període d'assecament	Curt (< 7 dies) (7)
Color	Clar

Caràcters agronòmics

Rendiment per arbre	Elevat
Resistència a badament	Susceptible
Resistència a plagues	sensible a la formiga
Resistència a agrit	Molt susceptible
Resistència al transport	Baixa

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Estelrich, P. ^[2]	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)
Llibres i altres monografies	Pons, M. ^[2]	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana ^[2]
Llibres i altres monografies	Rosselló, J. ^[2]	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca ^[2]