



Descripció de la varietat

La figa "de la tira", externament sembla una ?Alacantina? grossa però la seva polpa és rogenca i l'epidermis més prima.

Usos i coneixements

Consum humà

Sequer per al consum humà i del bestiar.

Caràcters morfològics de la varietat

Fenologia

Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figues agostenques
Inici de la maduració	Tardana (15-31 d'agost) (18 d'agost)
Plena maduresa de les figues	Mitjana (11-31 d'agost) (23 - 31 d'agost)
Període de collita (dies)	Mitjà (21-40 dies) (37)

Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Obert
Vigor	Elevat
Ramificació	Dominància apical present, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Densa
Forma del borro terminal	Cònica
Color del borro terminal	Groc
Llargària dels brots (cm)	Curta (< 10 cm) (7)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (8,4)
Color dels brots	marró o verd
Tendència a emetre tanyades	Molt poca
Data d'abscisió de fulles	20 de setembre
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

Fulla

Nombre de fulles/brot	6,3
Nombre de lòbuls	Trilobada (95%) i pentalobada (< 5%)
Amplada de la fulla (cm)	17,4
Llargària de la fulla (cm)	19,3
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Serrat
Sinus peciolar	Obtús (90° - 120°)
Densitat de pèls	Nombrosa al revers
Llargària del peciolar (cm)	Mitjana (5-8 cm) (6,4)
Diàmetre del peciolar (mm)	4,4
Secció del peciolar	Redona
Color del peciolar	Verd groguenc

Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Ouada
Forma (l= amplada/llargària)	Allargada o el·líptica transversal (l < 0,9) (0,89)
Percentatge de siconis emparellats (%)	0
Pes (g)	35
Amplada del fruit (mm)	Mitjana (38-49) (40-45)

Llargària del fruit (mm)	Mitjana (46-54) (45-48)
Uniformitat de les dimensions	Uniforme
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostiol (mm)	3-5
Gota a l'ull	Absent
Grandària de les esquames	Mitjana
Color de les esquames	Taronja clar
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	5-10
Formacions anormals	0
Abscisió del peduncle	Fàcil
Facilitat de pelada	Molta
Costelles	Poc marcades
Clivells	Reticular
Gruix de l'epidermis (mm)	0,1 - 0,3
Textura de l'epidermis	Fina
Color de fons de l'epidermis	Verd groguenc
Color de l'estampat de l'epidermis	Absent
Color de l'albedo	Clar
Color de la polpa	Ambre
Sabor	Fat fres, bona seca
Cavitat interna	Mitjana
Quantitat d'aquis	Pocs

Característiques de les figues seques

Període d'assecamment	Curt (< 7 dies) (7)
Color	Clar

Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	4,3
Rendiment per arbre	Elevat
Resistència a badament	Mitjana
Resistència a agrit	Susceptible
Resistència al transport	Baixa

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Estelrich, P. ^[2] ^[2]	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)
Llibres i altres monografies	Pons, M. ^[2] ^[2]	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana ^[2]
Llibres i altres monografies	Rosselló, J. ^[2] ^[2]	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca ^[2]