



Descripció de la varietat

Torna secallona amb facilitat i es conserva bé. Diverses cultivars poden rebre el nom ?D'ull de perdiu?.

Usos i coneixements

Consum animal

Caràcters morfològics de la varietat

Fenologia

Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figaflors i figues agostenques
Inici de la maduració	Tardana (15-31 d'agost) (20 d'agost)
Plena maduresa de les figues	Mitjana (11-31 d'agost) (25 d'agost)
Període de collita (dies)	Mitjà (21-40 dies) (30)

Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Obert
Vigor	Mitjà
Ramificació	Dominància apical present, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Densa
Forma del borró terminal	Cònica
Color del borró terminal	Verd groguenc
Llargària dels brots (cm)	Curta (< 10 cm) (5-7)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (8,4)
Color dels brots	Marró
Tendència a emetre tanyades	Molt poca
Data d'abscisió de fulles	primers d'octubre
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

Fulla

Nombre de fulles/brot	5,2
Nombre de lòbuls	Trilobada (80-85%) i pentalobada (15-20%)
Amplada de la fulla (cm)	15
Llargària de la fulla (cm)	17
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Ondulat
Sinus peciolar	60°-180°
Densitat de pèls	Nombrosa al revers
Llargària del peciolar (cm)	Mitjana (5-8 cm) (5,6)
Diàmetre del peciolar (mm)	4,6
Secció del peciolar	Redona
Color del peciolar	Verd groguenc

Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Ouada cònica
Forma (l= amplada/llargària)	0,8-0,82
Percentatge de siconis emparellats (%)	7
Pes (g)	19,1
Amplada del fruit (mm)	Petita (28-38) (32-37)
Llargària del fruit (mm)	Curta (29-46) (40-45)

Uniformitat de les dimensions	Variable
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostiol (mm)	0-1
Gota a l'ull	Absent
Grandària de les esquames	Petita
Color de les esquames	Rosat
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	1-4
Formacions anormals	0
Abscició del peduncle	Fàcil
Facilitat de pelada	Poca
Costelles	Prominents
Clivells	Longitudinal escàs
Gruix de l'epidermis (mm)	0,5
Textura de l'epidermis	Fina
Color de fons de l'epidermis	Verd groguenc
Color de l'albedo	Clar
Color de la polpa	Ambre
Sabor	fat
Cavitat interna	Petita
Quantitat d'aquenis	Mitjans

Característiques de les figues seques

Període d'assecamment	Curt (< 7 dies) (7 dies)
Color	Clar

Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	3,7
Rendiment per arbre	Mitjà
Resistència a badament	Molt resistent
Resistència al transport	Mitjana

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Rosselló, J.	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca
Llibres i altres monografies	Pons, M.	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana
Llibres i altres monografies	Estelrich, P.	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)