



Descripció de la varietat

Té molta semblança amb la cultivar 'Rotgisca'. S'hi han observat figafors en alguns casos.

Usos i coneixements

Consum animal

Caràcters morfològics de la varietat

Fenologia	
Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figues agostenques
Inici de la maduració	Tardana (15-31 d'agost) (18 d'agost)
Plena maduresa de les figues	Mitjana (11-31 d'agost) (24 d'agost - 1 de setembre)
Període de collita (dies)	Mitjà (21-40 dies) (30)

Arbre i ramificació	
Hàbit de creixement	Desmai
Vigor	Mitjà
Ramificació	Dominància apical absent, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Mitjana
Forma del borro terminal	Cònica
Color del borro terminal	Groc
Llargària dels brots (cm)	Mitjana (11-20 cm) (15)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (9,1)
Color dels brots	Marró
Tendència a emetre tanyades	Molt poca
Data d'abscisió de fulles	30 de setembre
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

Fulla	
Nombre de fulles/brot	5,4
Nombre de lòbuls	Trilobada (85%) i sencera (15%)
Amplada de la fulla (cm)	15
Llargària de la fulla (cm)	17,4
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Serrat
Sinus peciolar	90º - 120º
Densitat de pèls	Nombrosa al revers
Llargària del peciòl (cm)	Curta (< 5 cm) (4,2)
Diàmetre del peciòl (mm)	5,8
Secció del peciòl	Redona
Color del peciòl	Verd groguenc

Fruit	
Forma segons la situació del diàmetre màxim	Ouada
Forma (l= amplada/llargària)	Allargada o el·líptica transversal (l < 0,9) (0,83)
Percentatge de siconis emparellats (%)	9
Pes (g)	31
Amplada del fruit (mm)	Mitjana (38-49) (35-42)
Llargària del fruit (mm)	Mitjana (46-54) (42-50)

Uniformitat de les dimensions	Variable
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostiol (mm)	1-3
Gota a l'ull	Present
Grandària de les esquames	Grossa
Color de les esquames	Rosat
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	3-7
Formacions anormals	2
Abscició del peduncle	Difícil
Facilitat de pelada	Mitjana
Costelles	Prominents
Clivells	Longitudinal escàs
Gruix de l'epidermis (mm)	0,5 - 0,7
Textura de l'epidermis	Aspra
Color de fons de l'epidermis	Terrós
Color de l'albedo	Clar
Color de la polpa	Vermell fosc
Sabor	aigualit
Cavitat interna	Absent
Quantitat d'aquenís	Molts

Característiques de les figues seques	
Període d'assecament	Curt (< 7 dies) (7)
Color	Fosc

Caràcters agronòmics	
Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	4,8
Rendiment per arbre	Mitjà
Resistència a badament	Resistent
Resistència a agrit	Susceptible
Resistència al transport	Baixa

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Rosselló, J. ^[?]	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca
Llibres i altres monografies	Pons, M. ^[?]	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana
Llibres i altres monografies	Estelrich, P.	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)