



### Descripció de la varietat

Distingible per l'epidermis mancada de clivells i l'ull que queda camuflat amb el mateix color que l'epidermis.

### Usos i coneixements

Consum humà

Consum fresc i sequer.

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Fenologia

Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figues agostenques
Inici de la maduració	Tardana (15-31 d'agost) (18 d'agost)
Plena maduresa de les figues	Mitjana (11-31 d'agost) (21-29 d'agost)
Període de collita (dies)	Mitjà (21-40 dies) (25 dies)

#### Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Obert
Vigor	Reduït
Ramificació	Dominància apical absent, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Clara
Forma del borró terminal	Cònica
Color del borró terminal	Groc
Llargària dels brots (cm)	Curta (< 10 cm) (10)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (8,7)
Color dels brots	marró clar
Tendència a emetre tanyades	Molt poca
Data d'abscisió de fulles	primers d'octubre
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

#### Fulla

Nombre de fulles/brot	2,7
Nombre de lòbuls	Trilobada (100%)
Amplada de la fulla (cm)	17,1
Llargària de la fulla (cm)	18,3
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Serrat
Sinus peciolar	Obtús (120º-140º)
Densitat de pèls	Nombrosa al revers
Llargària del pecíol (cm)	Mitjana (5-8 cm) (5,7)
Diàmetre del pecíol (mm)	5,2
Secció del pecíol	Redona
Color del pecíol	Verd groguenc

#### Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Ouada
Forma (l= amplada/llargària)	Globosa o circular (l = 0,9-1,1) (1)
Percentatge de siconis emparellats (%)	0
Pes (g)	16,7
Amplada del fruit (mm)	Petita (28-38) (32-37)

Llargària del fruit (mm)	Curta (29-46) (32-37)
Uniformitat de les dimensions	Uniforme
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostiol (mm)	0-1
Gota a l'ull	Present
Grandària de les esquames	Mitjana
Color de les esquames	Marró
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	5
Formacions anormals	0
Abscisió del peduncle	Difícil
Facilitat de pelada	Mitjana
Costelles	Prominents
Clivells	Absents
Gruix de l'epidermis (mm)	0,5-1
Textura de l'epidermis	Aspra
Color de fons de l'epidermis	Negre/morat
Color de l'albedo	Clar
Color de la polpa	Vermell
Sabor	poc dolç
Cavitat interna	Petita
Quantitat d'aquenis	Molts

### Característiques de les figues seques

Període d'assecamment	Curt (< 7 dies) (7 dies)
-----------------------	--------------------------

### Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	2,3
Rendiment per arbre	Mitjà
Resistència a badament	Resistent
Resistència a plagues	susceptible a Ceratitis
Resistència a agrit	Susceptible
Resistència al transport	Baixa

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Rosselló, J.	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca
Llibres i altres monografies	Pons, M.	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana
Llibres i altres monografies	Estelrich, P.	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)