



### Descripció de la varietat

Produeix un exudat de petites gotes que se solidifiquen en travessar els clivells de l'epidermis cap a fora i li donen un aspecte característic. Fora dels termes de Sineu i Lloret s'empra ?De la senyora? com una sinonímia d'?Hivernenca?.

### Usos i coneixements

Consum humà

Consum en fresc i sequer.

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Fenologia

Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figues agostenques
Inici de la maduració	Mitjana (1-15 d'agost) (12 d'agost)
Plena maduresa de les figues	Mitjana (11-31 d'agost) (15-23 d'agost)
Període de collita (dies)	Mitjà (21-40 dies) (29)

#### Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Obert
Vigor	Mitjà
Ramificació	Dominància apical absent, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Densa
Forma del borro terminal	Cònica
Color del borro terminal	Groc
Llargària dels brots (cm)	Curta (< 10 cm) (5)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (8,6)
Color dels brots	Marró
Tendència a emetre tanyades	Molt poca
Data d'abscisió de fulles	Primers d'octubre
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

#### Fulla

Nombre de fulles/brot	4,4
Nombre de lòbuls	Trilobada (95%) i sencera (
Amplada de la fulla (cm)	17,5
Llargària de la fulla (cm)	17
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Serrat
Sinus peciolar	90° - 120°
Densitat de pèls	Nombrosa al revers
Llargària del pecíol (cm)	Mitjana (5-8 cm) (5,5)
Diàmetre del pecíol (mm)	5
Secció del pecíol	Redona
Color del pecíol	Verd groguenc

#### Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Ouada
Forma (l= amplada/llargària)	Allargada o el·líptica transversal (l < 0,9) (0,87)
Percentatge de siconis emparellats (%)	0
Pes (g)	18,2

Amplada del fruit (mm)	Petita (28-38) (35)
Llargària del fruit (mm)	Curta (29-46) (40)
Uniformitat de les dimensions	Variable
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostíol (mm)	1-3
Gota a l'ull	Absent
Grandària de les esquames	Mitjana
Color de les esquames	Rosat a morat
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	5-10
Formacions anormals	0
Absció del peduncle	Fàcil
Facilitat de pelada	Mitjana
Costelles	Intermèdies
Clivells	Reticular
Gruix de l'epidermis (mm)	0,6 - 0,8
Textura de l'epidermis	Aspra
Color de fons de l'epidermis	Verd groguenc
Color de l'albedo	Clar
Color de la polpa	Vermell
Sabor	dolç
Cavitat interna	Mitjana
Quantitat d'aquenis	Molts

### Característiques de les figues seques

Període d'assecamment	Curt (< 7 dies) (7)
Color	Clar

### Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	3,7
Rendiment per arbre	Mitjà
Resistència a badament	Resistent
Resistència a plagues	resistent a Ceratitis
Resistència a agrit	Resistent
Resistència al transport	Mitjana

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Rosselló, J. <sup>[2]</sup>	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca
Llibres i altres monografies	Pons, M. <sup>[2]</sup>	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana <sup>[2]</sup>
Llibres i altres monografies	Estelrich, P.	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma) <sup>[2]</sup>