



### Descripció de la varietat

Sembla del grup de les alacantines i és l'única juntament amb l'Alacantina? i Jorba? amb el color groguenc de polpa.

### Usos i coneixements

Consum humà  
Sequer principalment.

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Fenologia

Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figues agostenques
Inici de la maduració	Mitjana (1-15 d'agost) (7 d'agost)
Plena maduresa de les figues	Mitjana (11-31 d'agost) (14-22 d'agost)
Període de collita (dies)	Mitjà (21-40 dies) (28 dies)

#### Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Obert
Vigor	Reduït
Ramificació	Dominància apical present, desenvolupament lateral absent
Densitat de ramificació	Densa
Forma del berró terminal	Cònica
Color del berró terminal	Groc
Llargària dels brots (cm)	Curta (< 10 cm) (10)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (8,7)
Color dels brots	Marró
Tendència a emetre tanyades	Molt poca
Data d'abscisió de fulles	1 d'octubre
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

#### Fulla

Nombre de fulles/brot	6
Nombre de lòbuls	Trilobada (80%), pentalobada (10%) i sencera (10%)
Amplada de la fulla (cm)	14,3
Llargària de la fulla (cm)	15,7
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Serrat
Sinus peciolar	Agut (40°-90°)
Densitat de pèls	Nombrosa al revers
Llargària del peciolar (cm)	Mitjana (5-8 cm) (6,2)
Diàmetre del peciolar (mm)	4,7
Secció del peciolar	Redona
Color del peciolar	Verd groguenc

#### Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Cònica
Forma (l= amplada/llargària)	Globosa o circular (l = 0,9-1,1) (1)
Percentatge de siconis emparellats (%)	5
Pes (g)	19,3
Amplada del fruit (mm)	Mitjana (38-49) (35-40)

Llargària del fruit (mm)	Curta (29-46) (35-40)
Uniformitat de les dimensions	Uniforme
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostiol (mm)	0-1
Gota a l'ull	Absent
Grandària de les esquames	Mitjana
Color de les esquames	Taronja clar
Forma del peduncle	Troncocònic
Llargària del peduncle (mm)	10-12
Formacions anormals	10
Abscició del peduncle	Fàcil
Facilitat de pelada	Mitjana
Costelles	Prominents
Clivells	Absents
Gruix de l'epidermis (mm)	0,5
Textura de l'epidermis	Aspra
Color de fons de l'epidermis	Verd groguenc
Color de l'albedo	Clar
Color de la polpa	Ambre
Sabor	fat
Cavitat interna	Grossa
Quantitat d'aquenis	Molts

### Característiques de les figues seques

Període d'asseccament	Curt (< 7 dies) (7 dies)
Color	Clar

### Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	5
Rendiment per arbre	Elevat
Resistència a badament	Resistent
Resistència a plagues	Ceratitis
Resistència a agrit	Susceptible
Resistència al transport	Baixa

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Rosselló, J.	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura
Llibres i altres monografies	Pons, M.	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana
Llibres i altres monografies	Estelrich, P.	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)