



Descripció de la varietat

Estelrich considera la ?Bergunya? com una sinonímia d'?Hivernenca?; totes dues comparteixen trets diferenciadors del fruits i del fullam, encara que la ?Bergunya? es distingeix per una epidermis més prima i delicada, però resistent a badaments i per una forma més aperada de les figues.

Usos i coneixements

Consum humà
Consum en freq.

Caràcters morfològics de la varietat

Fenologia

Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figues tardanes
Inici de la maduració	Molt tardana (>31 d'agost) (15 de setembre)
Plena maduresa de les figues	Molt tardana (>1 d'octubre) (24 de setembre - 2 d'octubre)
Període de collita (dies)	Mitjà (21-40 dies) (33 - 39)

Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Obert
Vigor	Mitjà
Ramificació	Dominància apical present, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Densa
Forma del borró terminal	Cònica
Color del borró terminal	Verd
Llargària dels brots (cm)	Mitjana (11-20 cm) (15-20)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (7,8)
Color dels brots	Marró
Tendència a emetre tanyades	Poca
Data d'abscisió de fulles	10 d'octubre
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

Fulla

Nombre de fulles/brot	6,7
Nombre de lòbuls	Pentalobada (95%) i trilobada (
Amplada de la fulla (cm)	14,5
Llargària de la fulla (cm)	16,5
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Serrat
Sinus peciolar	Còncav (180° - 200°)
Densitat de pèls	Escassa al revers
Llargària del peciolar (cm)	Llarga (> 8 cm) (9,9)
Diàmetre del peciolar (mm)	14,4
Secció del peciolar	Redona
Color del peciolar	Verd groguenc

Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Aperada
Forma (l= amplada/llargària)	Allargada o el·líptica transversal (l < 0,9) (0,88)
Percentatge de siconis emparellats (%)	0

Pes (g)	24,2
Amplada del fruit (mm)	Mitjana (38-49) (35-40)
Llargària del fruit (mm)	Mitjana (46-54) (40-45)
Uniformitat de les dimensions	Variable
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostiol (mm)	0-1
Gota a l'ull	Absent
Grandària de les esquames	Petita
Color de les esquames	Morat
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	1-4
Formacions anormals	2
Abscició del peduncle	Fàcil
Facilitat de pelada	Mitjana
Costelles	Poc marcades
Clivells	Longitudinal escàs
Gruix de l'epidermis (mm)	0,3
Textura de l'epidermis	Mitjana
Color de fons de l'epidermis	Negre/morat
Color de l'albedo	Clar
Color de la polpa	Vermell fosc
Sabor	Normal - fat
Cavitat interna	Mitjana
Quantitat d'aquenís	Molts

Característiques de les figues seques

Període d'assecament	Mitjà (7-14 dies) (7-14)
Color	Fosc

Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	5
Rendiment per arbre	Mitjà
Resistència a badament	Molt resistent
Resistència al transport	Mitjana

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Rosselló, J. ¹	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca
	²		
Llibres i altres monografies	Pons, M. ³	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana
Llibres i altres monografies	Estelrich, P.	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)