



Descripció de la varietat

El terç superior cònic junt amb la base plana de la figa trenquen la forma ouada de la resta del seu perfil i permeten tipificar-la com a cònica.

Usos i coneixements

Consum humà
Fresca i seca

Caràcters morfològics de la varietat

Fenologia

Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figues tardanes
Inici de la maduració	Molt tardana (>31 d'agost) (4 de setembre)
Plena maduresa de les figues	Tardana (1-30 de setembre) (16-40 de setembre)
Període de collita (dies)	Llarg (41-60 dies) (34 - 48)

Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Obert
Vigor	Mitjà
Ramificació	Dominància apical present, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Densa
Forma del borró terminal	Cònica
Color del borró terminal	Verd
Llargària dels brots (cm)	Curta (< 10 cm) (5)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (8,4)
Color dels brots	Marró
Tendència a emetre tanyades	Molt poca
Data d'abscisió de fulles	20 d'octubre

Fulla

Nombre de fulles/brot	5,7
Nombre de lòbuls	Trilobada (90%) i sencera (10%)
Amplada de la fulla (cm)	13,3
Llargària de la fulla (cm)	17
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Serrat
Sinus peciolar	180°
Densitat de pèls	Escassa al revers
Llargària del pecíol (cm)	Curta (< 5 cm) (4,7)
Diàmetre del pecíol (mm)	4,1
Secció del pecíol	Redona
Color del pecíol	Verd groguenc

Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Cònica
Forma (l= amplada/llargària)	Globosa o circular (l = 0,9-1,1) (1)
Percentatge de siconis emparellats (%)	4
Pes (g)	20,7
Amplada del fruit (mm)	Petita (28-38) (37)

Llargària del fruit (mm)	Curta (29-46) (37)
Uniformitat de les dimensions	Uniforme
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostiol (mm)	1-3
Gota a l'ull	Present
Grandària de les esquames	Petita
Color de les esquames	Taronja/blanc
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	2-4
Formacions anormals	3
Abscisió del peduncle	Difícil
Facilitat de pelada	Mitjana
Costelles	Poc marcades
Clivells	Longitudinal escàs
Gruix de l'epidermis (mm)	0,3-0,4
Textura de l'epidermis	Aspra
Color de fons de l'epidermis	Verd groguenc
Color de l'estampat de l'epidermis	Petits punts clars
Color de l'albedo	Blanc
Color de la polpa	Vermell fosc
Sabor	Excel·lent
Cavitat interna	Petita
Quantitat d'aquis	Molts

Característiques de les figues seques

Període d'assecamment	Mitjà (7-14 dies) (7-14)
Color	Fosc

Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	3,5
Rendiment per arbre	Mitjà
Resistència a badament	Molt resistent
Resistència a plagues	resistent a Ceratitis
Resistència a agrit	Resistent
Resistència al transport	Alta

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Estelrich, P.	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)
Llibres i altres monografies	Pons, M.	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana
Llibres i altres monografies	Rosselló, J. ²	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca ²