



Descripció de la varietat

Un caràcter distintiu per aquesta figa és l'enrogiment del pecíol de la figa en la part basal i també al borró terminal. Té bones qualitats comercials per la grandària i la llarga durada del període de collita.

Usos i coneixements

Consum humà

Consum en fresc, humà i per bestiar.

Caràcters morfològics de la varietat

Fenologia

Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figues agostenques
Inici de la maduració	Tardana (15-31 d'agost) (25 d'agost)
Plena maduresa de les figues	Tardana (1-30 de setembre) (4 - 12 de setembre)
Període de collita (dies)	Llarg (41-60 dies) (41)

Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Desmai
Vigor	Elevat
Ramificació	Dominància apical present, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Densa
Forma del borró terminal	Cònica
Llargària dels brots (cm)	Llarg (21-35 cm) (20-35)
Diàmetre dels brots (mm)	Mitjà (11 - 15 cm) (10,3)
Color dels brots	marró verdós
Tendència a emetre tanyades	Poca
Data d'abscisió de fulles	20 de setembre
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

Fulla

Nombre de fulles/brot	7
Nombre de lòbuls	Trilobades (60%) i senceres (40%)
Amplada de la fulla (cm)	18,5
Llargària de la fulla (cm)	21,3
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Ondulat
Sinus peciolar	Obtús (60° - 110°)
Densitat de pèls	Escassa al revers
Llargària del pecíol (cm)	Mitjana (5-8 cm) (8,2)
Diàmetre del pecíol (mm)	6,2
Secció del pecíol	Redona
Color del pecíol	Verd groguenc

Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Cònica
Forma (l= amplada/llargària)	Globosa o circular (l = 0,9-1,1) (1)
Percentatge de siconis emparellats (%)	20 - 30
Pes (g)	50
Amplada del fruit (mm)	Ampla (50-60 (47 - 55)

Llargària del fruit (mm)	Mitjana (46-54) (47 - 55)
Uniformitat de les dimensions	Variable
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostiol (mm)	3-5
Gota a l'ull	Absent
Grandària de les esquames	Mitjana
Color de les esquames	Vermell
Forma del peduncle	Troncocònic
Llargària del peduncle (mm)	5-12
Formacions anormals	0
Abscisió del peduncle	Difícil
Facilitat de pelada	Mitjana
Costelles	Poc marcades
Clivells	Longitudinal escàs
Gruix de l'epidermis (mm)	0,5
Textura de l'epidermis	Aspra
Color de fons de l'epidermis	Negre/morat
Color de l'albedo	Clar
Color de la polpa	Vermell fosc
Sabor	Dolç i apreciat
Cavitat interna	Mitjana
Quantitat d'aquenis	Pocs




Característiques de les figues seques

Període d'assecamment	Mitjà (7-14 dies) (7-14)
Color	Fosc

Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	5,2
Rendiment per arbre	Elevat
Resistència a badament	Mitjana
Resistència a plagues	resistent a Ceratitis
Resistència al transport	Baixa

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Estelrich, P.	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma) 
Llibres i altres monografies	Pons, M. 	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana 
Llibres i altres monografies	Rosselló, J.	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca 