



### Descripció de la varietat

A pesar de fruitar dues collites no és gaire coneguda com a cultivar bífera. La precocitat de maduració i l'abundància de formes asimètriques confirmen el seu genotip.

### Usos i coneixements

Consum animal

Consum per bestiar, fresca i seca.

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Fenologia

Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figaflors i figues agostenques
Inici de la maduració	Mitjana (1-15 d'agost) (11 d'agost)
Plena maduresa de les figaflors	Tardana (16-30 de juny) (20 de juny)
Plena maduresa de les figues	Mitjana (11-31 d'agost) (15-23 d'agost)
Període de collita (dies)	Mitjà (21-40 dies) (24 dies)

#### Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Obert
Vigor	Reduït
Ramificació	Dominància apical absent, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Mitjana
Forma del borro terminal	Cònica
Color del borro terminal	Groc
Llargària dels brots (cm)	Curta (< 10 cm) (10)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (8,7)
Color dels brots	Marró (marró clar tacat de groc)
Tendència a emetre tanyades	Molt poca
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

#### Fulla

Nombre de fulles/brot	5,1
Nombre de lòbuls	Pentalobada (70%), trilobada (25%) i sencera (5%)
Amplada de la fulla (cm)	16,2
Llargària de la fulla (cm)	17
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Serrat
Sinus peciolar	Agut (90°-60°)
Densitat de pèls a l'envers	
Llargària del peciolar (cm)	Curta (< 5 cm) (3,2)
Diàmetre del peciolar (mm)	5,1
Secció del peciolar	Redona
Color del peciolar	Verd groguenc

#### Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Cònica
Forma (l= amplada/llargària)	Allargada o el·líptica transversal (l < 0,9) (0,8)
Percentatge de siconis emparellats (%)	0

Pes (g)	21
Amplada del fruit (mm)	Mitjana (38-49) (35-40)
Llargària del fruit (mm)	Curta (29-46) (45)
Uniformitat de les dimensions	Uniforme
Simetria	Assimètric
Diàmetre de l'ostiol (mm)	0-1
Gota a l'ull	Absent
Grandària de les esquames	Mitjana
Color de les esquames	Morat
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	5
Formacions anormals (%)	0
Abscició del peduncle	Fàcil
Facilitat de pelada	Mitjana
Costelles	Poc marcades
Clivells	Absents
Gruix de l'epidermis (mm)	0,8-0,9
Textura de l'epidermis	Fina
Color de fons de l'epidermis	Negre/morat
Color de l'albedo	Clar
Color de la polpa	Vermell
Cavitat interna	Grossa
Quantitat d'aquis	Molts
Sabor	fat

### Característiques de les figues seques

Color	Fosc
Període d'assecament	Curt (

### Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	4,5
Rendiment per arbre	Elevat
Resistència al transport	Baixa
Resistència a badament	Mitjana

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Llibres i altres monografies R osselló, J.	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca
Llibres i altres monografies	Pons, M.	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana
Llibres i altres monografies	Estelrich, P.	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)