



Descripció de la varietat

Cultivar de fruits durs i resistent a les afeccions més comunes, de sabor dolent. Interessant per l'elevada vigoria dels arbres.

Usos i coneixements

Consum animal

Caràcters morfològics de la varietat

Fenologia

| | |
|------------------------------|--|
| Data inici de la brotació | 15 de març |
| Distribució de la collita | Figues tardanes |
| Inici de la maduració | Molt tardana (>31 d'agost) (5 de setembre) |
| Plena maduresa de les figues | Tardana (1-30 de setembre) (16-24 de setembre) |
| Període de collita (dies) | Llarg (41-60 dies) (43) |

Arbre i ramificació

| | |
|-----------------------------|--|
| Hàbit de creixement | Desmai |
| Vigor | Elevat |
| Ramificació | Dominància apical absent, desenvolupament lateral absent |
| Densitat de ramificació | Mitjana |
| Forma del borro terminal | Cònica |
| Color del borro terminal | Verd |
| Llargària dels brots (cm) | Mitjana (11-20 cm) (15) |
| Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) (9,3) |
| Color dels brots | Marró |
| Tendència a emetre tanyades | Molt poca |
| Data d'abscisió de fulles | Primers d'octubre |
| Presència de bonys nodals | A la soca i les branques |

Fulla

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nombre de fulles/brot | 5,5 |
| Nombre de lòbuls | Trilobada (70%) i sencera (30%) |
| Amplada de la fulla (cm) | 15,3 |
| Llargària de la fulla (cm) | 17,9 |
| Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges |
| Marges dels lòbuls | Ondulat |
| Sinus peciolar | 160° 180° |
| Densitat de pèls | Nombrosa al revers |
| Llargària del peciolar (cm) | Curta (< 5 cm) (5,5) |
| Diàmetre del peciolar (mm) | 5 |
| Secció del peciolar | Redona |
| Color del peciolar | Verd groguenc |

Fruit

| | |
|---|---|
| Forma segons la situació del diàmetre màxim | Cònica |
| Forma (l= amplada/llargària) | Allargada o el·líptica transversal (l < 0,9) (0,64 - 0,7) |
| Percentatge de siconis emparellats (%) | 17 |
| Pes (g) | 32,1 |
| Amplada del fruit (mm) | Molt ampla (> 60) (0,64) |
| Llargària del fruit (mm) | Llarga (52-70) (0,7) |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Uniformitat de les dimensions | Variable |
| Simetria | Simètric |
| Diàmetre de l'ostíol (mm) | 0-1 |
| Gota a l'ull | Absent |
| Grandària de les esquames | Mitjana |
| Color de les esquames | Rosat a morat |
| Forma del peduncle | Cilíndric |
| Llargària del peduncle (mm) | 5-8 |
| Formacions anormals | 0,1 |
| Abscició del peduncle | Difícil |
| Facilitat de pelada | Molta |
| Costelles | Poc marcades |
| Clivells | Longitudinal escàs |
| Gruix de l'epidermis (mm) | 0,4 - 0,6 |
| Textura de l'epidermis | Aspra |
| Color de fons de l'epidermis | Negre/morat |
| Color de l'albedo | Clar |
| Color de la polpa | Vermell |
| Sabor | Poc dolç |
| Cavitat interna | Absent |
| Quantitat d'aquenis | Molts |

Característiques de les figues seques

| | |
|------------------------|---------------------|
| Període d'assecamament | Curt (< 7 dies) (7) |
| Color | Fosc |

Caràcters agronòmics

| | |
|--|----------------|
| Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 4,8 |
| Rendiment per arbre | Elevat |
| Resistència a badament | Molt resistent |
| Resistència al transport | Alta |