



### Descripció de la varietat

Cultivar de fruits durs i resistent a les afeccions més comunes, de sabor dolent. Interessant per l'elevada vigoria dels arbres.

### Usos i coneixements

Consum animal

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Fenologia

Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figues tardanes
Inici de la maduració	Molt tardana (>31 d'agost) (5 de setembre)
Plena maduresa de les figues	Tardana (1-30 de setembre) (16-24 de setembre)
Període de collita (dies)	Llarg (41-60 dies) (43)

#### Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Desmai
Vigor	Elevat
Ramificació	Dominància apical absent, desenvolupament lateral absent
Densitat de ramificació	Mitjana
Forma del borró terminal	Cònica
Color del borró terminal	Verd
Llargària dels brots (cm)	Mitjana (11-20 cm) (15)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (9,3)
Color dels brots	Marró
Tendència a emetre tanyades	Molt poca
Data d'abscisió de fulles	Primers d'octubre
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

#### Fulla

Nombre de fulles/brot	5,5
Nombre de lòbuls	Trilobada (70%) i sencera (30%)
Amplada de la fulla (cm)	15,3
Llargària de la fulla (cm)	17,9
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Ondulat
Sinus peciolar	160° 180°
Densitat de pèls	Nombrosa al revers
Llargària del peciolar (cm)	Curta (< 5 cm) (5,5)
Diàmetre del peciolar (mm)	5
Secció del peciolar	Redona
Color del peciolar	Verd groguenc

#### Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Cònica
Forma (l= amplada/llargària)	Allargada o el·líptica transversal (l < 0,9) (0,64 - 0,7)
Percentatge de siconis emparellats (%)	17
Pes (g)	32,1
Amplada del fruit (mm)	Molt ampla (> 60) (0,64 )
Llargària del fruit (mm)	Llarga (52-70) (0,7)

Uniformitat de les dimensions	Variable
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostíol (mm)	0-1
Gota a l'ull	Absent
Grandària de les esquames	Mitjana
Color de les esquames	Rosat a morat
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	5-8
Formacions anormals	0,1
Abscició del peduncle	Difícil
Facilitat de pelada	Molta
Costelles	Poc marcades
Clivells	Longitudinal escàs
Gruix de l'epidermis (mm)	0,4 - 0,6
Textura de l'epidermis	Aspra
Color de fons de l'epidermis	Negre/morat
Color de l'albedo	Clar
Color de la polpa	Vermell
Sabor	Poc dolç
Cavitat interna	Absent
Quantitat d'aquenis	Molts

### Característiques de les figues seques

Període d'assecamament	Curt (< 7 dies) (7)
Color	Fosc

### Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	4,8
Rendiment per arbre	Elevat
Resistència a badament	Molt resistent
Resistència al transport	Alta