



### Descripció de la varietat

Cultivar de fruits durs i resistent a les afeccions més comunes, de sabor dolent. Interessant per l'elevada vigoria dels arbres.

### Usos i coneixements

Consum animal

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Fenologia

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Data inici de la brotació    | 15 de març                                     |
| Distribució de la collita    | Figues tardanes                                |
| Inici de la maduració        | Molt tardana (>31 d'agost) (5 de setembre)     |
| Plena maduresa de les figues | Tardana (1-30 de setembre) (16-24 de setembre) |
| Període de collita (dies)    | Llarg (41-60 dies) (43)                        |

#### Arbre i ramificació

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Hàbit de creixement         | Desmai   |
| Vigor                       | Elevat   |
| Ramificació                 | Dominància apical absent, desenvolupament lateral absent |
| Densitat de ramificació     | Mitjana  |
| Forma del borró terminal    | Cònica   |
| Color del borró terminal    | Verd   |
| Llargària dels brots (cm)   | Mitjana (11-20 cm) (15)                                  |
| Diàmetre dels brots (mm)    | Prim (< 10 mm) (9,3)                                     |
| Color dels brots            | Marró  |
| Tendència a emetre tanyades | Molt poca  |
| Data d'abscisió de fulles   | Primers d'octubre  |
| Presència de bonys nodals   | A la soca i les branques                                 |

#### Fulla

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nombre de fulles/brot         | 5,5                             |
| Nombre de lòbuls              | Trilobada (70%) i sencera (30%) |
| Amplada de la fulla (cm)      | 15,3                            |
| Llargària de la fulla (cm)    | 17,9                            |
| Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges             |
| Marges dels lòbuls            | Ondulat                         |
| Sinus peciolar                | 160° 180°                       |
| Densitat de pèls              | Nombrosa al revers              |
| Llargària del peciolar (cm)   | Curta (< 5 cm) (5,5)            |
| Diàmetre del peciolar (mm)    | 5                               |
| Secció del peciolar           | Redona                          |
| Color del peciolar            | Verd groguenc                   |

#### Fruit

|   |   |
|---|---|
| Forma segons la situació del diàmetre màxim | Cònica  |
| Forma (l= amplada/llargària)                | Allargada o el·líptica transversal (l < 0,9) (0,64 - 0,7) |
| Percentatge de siconis emparellats (%)      | 17  |
| Pes (g)                                     | 32,1  |
| Amplada del fruit (mm)                      | Molt ampla (> 60) (0,64 )                                 |
| Llargària del fruit (mm)                    | Llarga (52-70) (0,7)                                      |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Uniformitat de les dimensions | Variable           |
| Simetria                      | Simètric           |
| Diàmetre de l'ostíol (mm)     | 0-1                |
| Gota a l'ull                  | Absent             |
| Grandària de les esquames     | Mitjana            |
| Color de les esquames         | Rosat a morat      |
| Forma del peduncle            | Cilíndric          |
| Llargària del peduncle (mm)   | 5-8                |
| Formacions anormals           | 0,1                |
| Abscició del peduncle         | Difícil            |
| Facilitat de pelada           | Molta              |
| Costelles                     | Poc marcades       |
| Clivells                      | Longitudinal escàs |
| Gruix de l'epidermis (mm)     | 0,4 - 0,6          |
| Textura de l'epidermis        | Aspra              |
| Color de fons de l'epidermis  | Negre/morat        |
| Color de l'albedo             | Clar               |
| Color de la polpa             | Vermell            |
| Sabor                         | Poc dolç           |
| Cavitat interna               | Absent             |
| Quantitat d'aquenís           | Molts              |

### Característiques de les figues seques

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Període d'assecamament | Curt (< 7 dies) (7) |
| Color                  | Fosc                |

### Caràcters agronòmics

|  |                |
|--|----------------|
| Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 4,8            |
| Rendiment per arbre                      | Elevat         |
| Resistència a badament                   | Molt resistent |
| Resistència al transport                 | Alta           |