



Descripció de la varietat

Les figues sovint presenten taques semblants als símptomes de virosi i un elevat percentatge de formacions anormals

Usos i coneixements

Consum animal

Consum per bestiar porcí i sequer

Caràcters morfològics de la varietat

Fenologia

Distribució de la collita	Figaflors i figues tardanes
Inici de la maduració	Molt primerenca (
Plena maduresa de les figaflors	Tardana (16-30 de juny) (25 de juny - 1 de juliol)
Plena maduresa de les figues	Mitjana (11-31 d'agost) (20 d'agost - 1 de setembre)
Període de collita (dies)	Llarg (41-60 dies) (40-60)

Arbre i ramificació

Vigor	Elevat
Ramificació	Dominància apical absent, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Densa
Forma del borro terminal	Cònica
Color del borro terminal	Verd groguenc
Llargària dels brots (cm)	Mitjana (11-20 cm) (10-20)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (9,2)
Color dels brots	Verd marró
Tendència a emetre tanyades	Molt poca
Data d'abscisió de fulles	Primers d'octubre
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

Fulla

Nombre de lòbuls	Trilobada (80%), sencera (10%) i pentalobada (5%)
Amplada de la fulla (cm)	14-17
Llargària de la fulla (cm)	16-18
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Serrat
Sinus peciolar	Obtús (100° - 150°)
Llargària del peciol (cm)	Llarga (> 8 cm) (10)
Diàmetre del peciol (mm)	5
Secció del peciol	Esclafada
Color del peciol	Verd groguenc

Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Cònica
Forma (l= amplada/llargària)	Allargada o el·líptica transversal (l < 0,9) (0,8)
Percentatge de siconis emparellats (%)	1
Pes (g)	30
Amplada del fruit (mm)	Mitjana (38-49) (38)
Llargària del fruit (mm)	Mitjana (46-54) (48)
Uniformitat de les dimensions	Uniforme
Simetria	Simètric

Diàmetre de l'ostíol (mm)	6
Gota a l'ull	Absent
Grandària de les esquames	Mitjana
Color de les esquames	Blanc
Forma del peduncle	Troncocònic
Llargària del peduncle (mm)	3-5
Formacions anormals	5
Abscició del peduncle	Fàcil
Costelles	Intermèdies
Clivells	Longitudinal escàs
Gruix de l'epidermis (mm)	0,3
Textura de l'epidermis	Mitjana
Color de fons de l'epidermis	Verd groguenc
Color de l'albedo	Blanc
Color de la polpa	Rosa
Sabor	dolç (figues), fat (figafors)
Cavitat interna	Absent




Característiques de les figues seques

Període d'assecament	Curt (< 7 dies)
----------------------	-----------------

Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	3-4
Rendiment per arbre	Elevat
Resistència a badament	Resistent
Resistència a sequera	Resistent
Resistència al transport	Alta

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Rosselló, J. 	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca
Informe	Pons, M. 	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana
Llibres i altres monografies	Estelrich, P. 	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)