



Descripció de la varietat

Cultivar de fruits de considerable grandària amb bones qualitats organolèptiques. A pesar de la seva facilitat de badar-se en temps plujós és molt valorada com a figa de taula, és prou comercialitzada gràcies a l'elevat pes de la figa. És bona de conèixer per la forma i color, a més, el peduncle llarg i sempre verd ens confirmarà la identificació.

Usos i coneixements

Consum humà

Consum en fresc i seca com a pasta (pa de figa).

Caràcters morfològics de la varietat

Fenologia

Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figues agostenques
Inici de la maduració	Tardana (15-31 d'agost) (22 d'agost)
Plena maduresa de les figues	Mitjana (11-31 d'agost) (26 d'agost - 3 de setembre)
Període de collita (dies)	Mitjà (21-40 dies) (35 dies)

Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Obert
Vigor	Mitjà
Ramificació	Dominància apical absent, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Mitjana
Forma del borro terminal	Cònica
Color del borro terminal	Verd
Llargària dels brots (cm)	Curta (< 10 cm) (5-7)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (9,3)
Color dels brots	Marró
Tendència a emetre tanyades	Poca
Data d'abscisió de fulles	1-5 d'octubre
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

Fulla

Nombre de fulles/brot	6,7
Nombre de lòbuls	Trilobada
Amplada de la fulla (cm)	17
Llargària de la fulla (cm)	17,4
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Serrat
Sinus peciolar	Obtús (150º-180º)
Densitat de pèls	Nombrosa al revers
Llargària del peciolar (cm)	Mitjana (5-8 cm) (6,0)
Diàmetre del peciolar (mm)	5,9
Secció del peciolar	Redona
Color del peciolar	Verd groguenc

Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Globosa
Forma (l= amplada/llargària)	Globosa o circular (l = 0,9-1,1) (1)
Percentatge de siconis emparellats (%)	2

Pes (g)	44,8
Amplada del fruit (mm)	Mitjana (38-49) (45-50)
Llargària del fruit (mm)	Mitjana (46-54) (45-50)
Uniformitat de les dimensions	Uniforme
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostiol (mm)	3-5
Gota a l'ull	Present
Grandària de les esquames	Mitjana
Color de les esquames	Morat
Forma del peduncle	Troncocònic
Llargària del peduncle (mm)	6-10
Formacions anormals	0
Abscició del peduncle	Fàcil
Facilitat de pelada	Poca
Costelles	Poc marcades
Clivells	Longitudinal abundant
Gruix de l'epidermis (mm)	0,3-0,5
Textura de l'epidermis	Aspra
Color de l'albedo	Clar
Color de la polpa	Vermell
Sabor	bo i apreciat
Cavitat interna	Petita
Quantitat d'aquenis	Pocs

Característiques de les figues seques

Període d'assecament	Curt (< 7 dies) (7 dies)
Color	Fosc

Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	3,9
Rendiment per arbre	Elevat
Resistència a badament	Susceptible
Resistència a agrit	Mitjana
Resistència al transport	Mitjana

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Rosselló, J.	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca
Llibres i altres monografies	Pons, M. ²	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana
Llibres i altres monografies	Estelrich, P.	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)