



**Descripció de la varietat**

Cultivar del grup de les alacantines, adequada per a sequer, presenta els anys humits una gran tendència a formar badocs per la qual cosa no pot competir amb l'Alacantina?, sembla que la seva virtut es trobava en la precocitat de collita tot i que no hi hem observat diferències significatives en les dates de maduració.

**Caràcters morfològics de la varietat**

Fenologia	
Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figues agostenques
Inici de la maduració	Mitjana (1-15 d'agost) (15 d'agost)
Plena maduresa de les figues	Mitjana (11-31 d'agost) (23 - 31 d'agost)
Període de collita (dies)	Mitjà (21-40 dies) (32)

Arbre i ramificació	
Hàbit de creixement	Desmai
Vigor	Reduït
Ramificació	Dominància apical absent, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Densa
Forma del borró terminal	Cònica
Color del borró terminal	Groc
Llargària dels brots (cm)	Mitjana (11-20 cm) (7-12)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (6,6)
Color dels brots	Marró
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

Fulla	
Nombre de fulles/brot	5,7
Nombre de lòbuls	Trilobada (95%) i pentalobada (< 5%)
Amplada de la fulla (cm)	19,3
Llargària de la fulla (cm)	18,6
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Marges dels lòbuls	Serrat
Sinus peciolar	60° - 100°
Llargària del pecíol (cm)	Mitjana (5-8 cm) (6,8)
Diàmetre del pecíol (mm)	5,5
Secció del pecíol	Redona
Color del pecíol	Verd groguenc

Fruit	
Forma (l= amplada/llargària)	Globosa o circular (l = 0,9-1,1) (1)
Percentatge de siconis emparellats (%)	8
Pes (g)	17,3
Amplada del fruit (mm)	Petita (28-38) (30)
Llargària del fruit (mm)	Curta (29-46) (35)
Uniformitat de les dimensions	Uniforme
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostíol (mm)	1-3
Gota a l'ull	Absent
Grandària de les esquames	Mitjana

Color de les esquames	Marró clar
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	5-7
Formacions anormals	0
Abscició del peduncle	Fàcil
Facilitat de pelada	Molta
Costelles	Poc marcades
Clivells	Longitudinal escàs
Gruix de l'epidermis (mm)	0,3 - 0,5
Textura de l'epidermis	Aspra
Color de fons de l'epidermis	Verd
Color de l'albedo	Blanc
Color de la polpa	Vermell
Sabor	Fat
Cavitat interna	Absent
Quantitat d'aquenis	Molts

### Característiques de les figues seques

Període d'assecament	Curt (< 7 dies) (7)
Color	Clar

### Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	3,3
Resistència a badament	Susceptible
Resistència a agrit	Resistent

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Estelrich, P.	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)
Llibres i altres monografies	Pons, M. <sup>[2]</sup>	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana
Llibres i altres monografies	Rosselló, J. <sup>[2]</sup>	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca <sup>[2]</sup>