



### Descripció de la varietat

Una de les poques cultivars de forma clarament esclafada; de figues molt semblants en color, maduració i qualitat a les de ?Bordissot negra?. A més, les distingeix el color vermell intens del seu capoll.

### Usos i coneixements

Consum humà  
Consum en fresc.

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Fenologia

Data inici de la brotació	15 de març
Distribució de la collita	Figues tardanes
Inici de la maduració	Molt tardana (>31 d'agost) (2 de stembre)
Plena maduresa de les figues	Molt tardana (>1 d'octubre) (12-20 de setembre)
Període de collita (dies)	Mitjà (21-40 dies) (37)

#### Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Obert
Vigor	Mitjà
Ramificació	Dominància apical present, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Densa
Forma del borro terminal	Cònica
Llargària dels brots (cm)	Curta (< 10 cm) (5-12)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (8,5)
Color dels brots	marró verdós
Tendència a emetre tanyades	Poca
Data d'abscisió de fulles	Primers d'octubre
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

#### Fulla

Nombre de fulles/brot	6,3
Nombre de lòbuls	Senceres (60%) i trilobades (40%)
Amplada de la fulla (cm)	14,1
Llargària de la fulla (cm)	16,6
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Sinus peciolar	Obtús (120º, 180º)
Densitat de pèls	Escassa al revers
Llargària del peciolar (cm)	Mitjana (5-8 cm) (7,3)
Diàmetre del peciolar (mm)	5,8
Secció del peciolar	Redona
Color del peciolar	Verd groguenc

#### Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Esclafada
Forma (l= amplada/llargària)	Esclafada o el·líptica longitudinal (l > 1,1) (1,22-1,37)
Percentatge de siconis emparellats (%)	5
Pes (g)	39,6
Amplada del fruit (mm)	Ampla (50-60 (45-55)
Llargària del fruit (mm)	Mitjana (46-54) (37-40)

Uniformitat de les dimensions	Variable
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostiol (mm)	3-5
Gota a l'ull	Present
Grandària de les esquames	Mitjana
Color de les esquames	Granat
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	2-5
Formacions anormals	0
Abscició del peduncle	Difícil
Facilitat de pelada	Molta
Costelles	Poc marcades
Gruix de l'epidermis (mm)	0,3-0,5
Textura de l'epidermis	Mitjana
Color de fons de l'epidermis	Negre/morat
Color de l'albedo	Blanc
Color de la polpa	Vermell fosc
Sabor	Molt bo
Cavitat interna	Petita
Quantitat d'aquenis	Pocs

### Característiques de les figues seques

Període d'assecament	Mitjà (7-14 dies) (7-14)
Color	Fosc

### Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	3,5
Rendiment per arbre	Mitjà
Resistència a badament	Molt resistent
Resistència a plagues	resistent a Ceratitis
Resistència al transport	Alta

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Estelrich, P. <sup>[2]</sup>	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)
Llibres i altres monografies	Pons, M. <sup>[2]</sup>	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana <sup>[2]</sup>
Llibres i altres monografies	Rosselló, J. <sup>[2][3]</sup>	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca <sup>[2]</sup>