



Descripció de la varietat

Diferenciada pels seus hàbits de fructificació semblant a la cabrafiguera: fa tres collites una de figuesflors (20 juny) la segona de figues (a mitjan agost) i la tercera (escassa i dolenta) tardana a l'octubre. Alt percentatge de siconis emparellats. Fulles asimètriques amb longituds de pecíol molt variables.

Usos i coneixements

Consum animal

Consum per bestiar porcí

Caràcters morfològics de la varietat

Fenologia

Distribució de la collita	Figafors
Inici de la maduració	Molt primerenca (
Plena maduresa de les figafors	Molt tardana (>1 de juliol) (30 de juny - 10 de juliol)
Plena maduresa de les figues	Mitjana (11-31 d'agost) (20 - 30 d'agost)
Període de collita (dies)	Llarg (41-60 dies) (55)

Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Desmai
Ramificació	Dominància apical absent, desenvolupament lateral present
Forma del borró terminal	Cònica
Color del borró terminal	Verd groguenc
Llargària dels brots (cm)	Mitjana (11-20 cm) (15)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (10)
Color dels brots	Marró
Data d'abscisió de fulles	Primers d'octubre
Presència de bonyes nodals	A la soca i les branques

Fulla

Nombre de fulles/brot	8
Nombre de lòbuls	Trilobades (60%), senceres (35%) i pentalobades (5%)
Amplada de la fulla (cm)	16-20
Llargària de la fulla (cm)	45-70
Presència de dents als lòbuls	Per tots els marges
Sinus peciolar	45°-100°
Llargària del pecíol (cm)	Llarga (> 8 cm) (45-70)
Diàmetre del pecíol (mm)	5,5
Secció del pecíol	Redona
Color del pecíol	Verd groguenc

Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Cònica
Forma (l= amplada/llargària)	Globosa o circular (l = 0,9-1,1)
Percentatge de siconis emparellats (%)	10-20
Pes (g)	36
Amplada del fruit (mm)	Mitjana (38-49) (40-45)
Llargària del fruit (mm)	Curta (29-46) (35-40)
Uniformitat de les dimensions	Uniforme
Simetria	Simètric

Diàmetre de l'ostíol (mm)	1-2
Gota a l'ull	Present
Grandària de les esquames	Mitjana
Color de les esquames	Morat
Forma del peduncle	Troncocònic
Llargària del peduncle (mm)	6
Formacions anormals	0
Abscició del peduncle	Fàcil
Facilitat de pelada	Poca
Costelles	Poc marcades
Clivells	Longitudinal escàs
Gruix de l'epidermis (mm)	0,2
Textura de l'epidermis	Mitjana
Color de fons de l'epidermis	Negre/morat
Color de l'albedo	Blanc
Color de la polpa	Rosa
Sabor	Molt fat
Cavitat interna	Petita

Característiques de les figues seques

Període d'assecament	Mitjà (7-14 dies)
----------------------	-------------------

Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	9-10
Resistència a badament	Molt resistent
Resistència a agrit	Susceptible
Resistència al transport	Baixa

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Estelrich, P. ^[2]	La higuera y su cultivo en España	Librería Escolar (Palma)
Llibres i altres monografies	Pons, M. ^[2]	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	Montserrat Pons Boscana
Llibres i altres monografies	Rosselló, J. ^[2]	Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca	Conselleria d'Agricultura i Pesca ^[2]