Bugadera

Garrover - *Ceratonia siliqua L.*



Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (18 cm de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví és mitjà; oscil·la entre el 13 i 17 %. Són de color marró obscur.

Origen de la varietat

És una varietat de les més exteses de Mallorca que es troba a Artà, Porrreres, Felanitx i Son Servera.

Usos i coneixements

Consum animal
El DCVB la classifica com aliment molt bo pel bestiar.

Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació	
Sexe	Femella
Vigor	Mitjà
Hàbit de creixement	Obert
Densitat de les fulles	Mitjana - elevada

Beina	
Forma	Recta
Superfície	Molt rugosa
Color	Marró obscur
Llargària	Llarga (> 18 cm) (17,93 ± 0,14)
Amplada	2,20 ± 0,11
Relació llargària/amplada	8,44 ± 0,69
Espessor marginal	0,93 ± 0,10
Espessor central	0,52 ± 0,07
Pes de la garrova (g)	Mitjana (12-17 g) (14,27 ± 2,76)
Pes de la polpa (g)	18,15 ± 3.41
Pes dels garrovins (g)	2,77 ± 0,51

Llavor	
Rendiment en garroví (%)	15,40 ± 7,11
Superficie de la llavor	Rugosa
Forma de la llavor	Ovalada
Llargària de la llavor	Llarga (> 9,5 mm) (10,9 ± 0,04)
Amplada de la llavor	Mitjana (6,75 - 7,5 mm) (7,3 ± 0,3)
Gruixa de la llavor	Prima (< 3,8 mm) (3,8 ± 0,3)
Pes de la llavor (g)	Mitjana (0,17 - 0,2 g) (0,2 ± 0,00)

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Alcover, A. M. i Moll, F. de B.	Diccionari català-valencià-balear	Diferents volums (1930-1962)
Llibres i altres monografies	Grosske Díaz, V.	Caracterización morfológica y agronómica del algarrobo (Ceratonia siliqua)	Escola Politècnica Superior; Universitat de les Illes Balears

Informe	Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.	Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares	Conselleria d'Agricultura i Pesca
Llibres i altres monografies	Rullan, J.	Memoria sobre el algarrobo y su cultivo en Mallorca	Imprenta y librería de Pedro José Gelabert