



Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves petites (de 14 a 16 cm de llargària), de bona presentació, i un pes de 10,50 - 16,50 g i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 14 - 20 %. Tous i col. (2003) estimaven una superfície d'unes 640 ha a Mallorca i la classificaven com a varietat secundària, de relativa importància.

Usos i coneixements

Consum animal

El DCVB la descriu com vermellova, grossa, bona; madura pel setembre.

Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació

Sexe	Femella
------	---------

Beina

Llargària (cm)	Mitjana (14-18 cm) (15,60 ± 1,19)
Amplada (cm)	Petita (< 1,85 cm) (1,88 ± 0,10)
Relació llargària/amplada	8,30 ± 0,50
Espessor marginal (cm)	0,89 ± 0,06
Espessor central (cm)	0,72 ± 0,09
Pes de la garrova (g)	Mitjana (12-17 g) (18,08 ± 3,53)
Pes de la polpa (g)	15,20 ± 3,55
Pes dels garrovins (g)	2,88 ± 0,11

Llavor

Llargària de la llavor (mm)	Mitjana (8,5-9,5 mm) (9,4 ± 0,3)
Amplada de la llavor (mm)	Ampla (> 7,5 mm) (7,8 ± 0,3)
Gruixa de la llavor (mm)	Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4,3 ± 0,2)
Pes de la llavor (g)	Gran (> 0,2 g) (0,25 ± 0,01)
Rendiment en garroví (%)	15,92 ± 3,84

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Grosske Díaz, V.	Caracterización morfológica y agronómica del algarrobo (<i>Ceratonia siliqua</i>)	Escola Politècnica Superior; Universitat de les Illes Balears
Informe	Tous, J.; Battle, I.; Rallo, J.; Romero, A.	Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares	Conselleria d'Agricultura i Pesca