



Descripció de la varietat

Els individus de la varietat Morisca presenten un gran vigor , un port erecte i elevada densitat a la seva capçada. La seva fulla és el·líptica lanceolada , amb una llargària superior als 7 cm i una amplada de 1-1,5 cm. Pel que fa al fruit, té un pes elevat, d’entre 4 i 5 grams, i una forma esfèrica, sense presència de mugró ni lenticel·les. L’endocarpi és de pes elevat, superior als 0,45 grams, té una forma ovoidal i no posseeix mugró. En general, el rendiment d’oli d’aquesta varietat es troba al voltant del 12%.

Origen de la varietat

La varietat Morisca s’ha cultivat tradicionalment a Mallorca, a zones properes a la Serra, com Andratx, mentre que és infreqüent a la resta de l’illa. Antigament, es deia que els collidors d’oliva passaven de llarg en veure aquesta varietat a causa del seu valor mínim per a elaboració de l’oli.

Usos i coneixements

Consum humà
L’oliva de la varietat Morisca és molt apreciada per a l’elaboració de preparats com Olives Trencades o Olives Pansides, ja que el fruit és molt gros i rodó, ?com a prunes de Frare Roig?.

Té un valor mínim per a l’elaboració d’oli, a causa del seu baix rendiment i per la qualitat de l’oli. Antigament, es deia que, per a fer oli ?No valen una maia: Donen aigua amarga?.

Observacions

També és coneguda com a Morisca de Mancor. Antigament, es deia que era la varietat amb olives de major calibre de Mallorca.

La varietat Morisca ha estat molt anomenada a bibliografia antiga. Ja fou citada primerament per l’Arxiduc Lluís Salvador, a l’any 1869; o també anomenada per Antoni Alcover i Francesc de Borja Moll al seu diccionari.

Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació

Vigor	Vigorós
Port	Erecte
Densitat de la capçada	Espessa

Inflorescència

Llargària (mm)	Curta (< 25 mm) (19,3 ± 3,6)
núm. flors/inflorescència	Baix (< 18) (14,80 ± 3,12)

Fulla

Forma (L/A)	El·líptica lanceolada (4 < L/A < 6)
Llargària (cm)	Llarga (> 7 cm)
Amplada (cm)	Mitjana (1-1,5 cm)
Curvatura	Recta

Fruit

Pes (g)	Alt (4 - 6 g)
Forma (L/A)	Esfèrica (L/A < 1,25)
Simetria (en posició A)	Assimètric
Posició diàmetre transversal (B)	Centrat
Àpex (en posició A)	Arrodonit
Base (en posició A)	Arrodonit
Mugró	Absent
Presència de lenticel·les	Absent
Color en Maduració	Negre

Endocarpi

Pes (g)	Elevat (0,45-0,7 g)
Forma (L/A)	Ovoidal (1,4 < L/A < 1,8)
Simetria	Simètrica
Àpex (posició A)	Arrodonit
Base (en posició B)	En punta
Rugositat superfície (en posició B)	Lleu
Nombre de solcs fibrovasculars	Baix (< 7)
Acabament de l'apex	Sense mugró

Qualitat de l'oli	
Rendiment (%)	Baix (?14%) (12)