



Descripció de la varietat

Varietat poc apreciada, present a Felanitx i Manacor, coincidint amb la del banc de germoplasme d'El Encín. Citada a Die Balearen i al Diccionari català-valencià-balear. S'empeltava al final de la fila, prop del camí, amb la creença que si algú volia agafar-ne un raïm, l'escollís per la mida.

Origen de la varietat

Pareix a ser que es trobava a Felanitx i Manacor. Actualment es troba a la col·lecció de varietats de vinya de sa Granja.

Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat/Pàmpol Jove

Obertura de la punta	Completament oberta
Presència de pèls tombats a la punta	Densos
Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Difusa
Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Dèbil

Fulla jove

Color de l'anvers del limbe (4a fulla)	Verd amb zones antociàniques
Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

Pàmpol

Port	Semiirecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd
Color de la cara ventral del nus	Verd

Circells

Longitud dels circells (cm)	Curts
-----------------------------	-------

Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Inserció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Fulla adulta

Longitud del limbe (cm)	Gran
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls del sinus peciolar	Oberta a la meitat
Longitud de les dents (cm)	Mitjana
Relació L/A de les dents	Gran
Forma de les dents	Ambdós costats rectilinis
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absent o molt baixa
Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Escassos
Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del peciòl en relació amb la nervadura central	Igual

Raïm

Longitud del raïm sense peduncle (cm)	Gran
Densitat/Compacitat	Compacta
Longitud del peduncle del raïm principal (cm)	Curta

Baia

Longitud de la baia (cm)	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Verd grogós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Moderadament ferma
Formació de llavors	Ben formades
Gust particular	Un altre gust

Fenologia

Època del desborrament	Molt primerenca
Època de l'inici del verolat	Tardana

Aptituds agronòmiques

Producció (kg)	5,63
Nombre de raïms	10,
Pes del raïm (g)	585,83
Vigor	Alt

Qualitat del raïm

Acidesa total	4,8
Alcohol potencial	11,7
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Mitjana

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca