



Descripció de la varietat

Planta provinent del banc de germoplasma d'El Encín, on està identificada com a sinonímia de la varietat canari. Tanmateix, les caracteritzacions ampelogràfica i molecular demostren que és diferent de la batista trobada en les darreres prospeccions fetes a les zones de Felanitx, Porreres, Montuïri i Algaida.

Origen de la varietat

Es conserva a la col·lecció de sa Granja. Es va prospectar a la zona del pla i migjorn de Mallorca, als municipis de Felanitx, Porreres, Montuïri i Algaida.

Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat

Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica	Rivetada
Pèls tombats	Densos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats	Mitjana

Fulla jove

Color del feix	Verd amb zones antociàniques
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Densos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Mitjana

Pàmpol

Port	Erecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara dorsal del nus	Verd i vermell
Color de la cara ventral del nus	Verd i vermell

Circells

Llargària	Molt curts
-----------	------------

Fulla adulta

Mida del limbe	Gran
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls al sinus peciolar	Lleugerament oberta
Llargària de les dents	Mitjana
Relació llargària/amplada de les dents	Mitjana
Forma de les dents	Ambdós costats rectilinis
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Alta o molt baixa
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans
Pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Escassos
Llargària del peciòl en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	A partir del cinquè nus

Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències
-------------------------------------	-------------------------

Raïm

Mida del raïm	Mitjana
Compacitat	Compacta
Llargària del peduncle del raïm principal	Curta

Baia

Mida de la baia	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermeza de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Gust particular	Cap
Formació de llavors	Ben formades

Fenologia

Època del desborrament	Mitjana
Època de l'inici del verolat	Mitjana

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca