



### Descripció de la varietat

Planta provinent del banc de germoplasma d'El Encín, on està identificada com a sinonímia de la varietat canari. Tanmateix, les caracteritzacions ampelogràfica i molecular demostren que és diferent de la batista trobada en les darreres prospeccions fetes a les zones de Felanitx, Porreres, Montuïri i Algaida.

### Origen de la varietat

Es conserva a la col·lecció de sa Granja. Es va prospectar a la zona del pla i migjorn de Mallorca, als municipis de Felanitx, Porreres, Montuïri i Algaida.

### Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Sumitat/Pàmpol Jove

|  |                     |
|--|---------------------|
| Obertura de la punta   | Completament oberta |
| Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | Difusa              |
| Presència de pèls tombats a la punta                                   | Densos              |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta                   | Mitjana             |

#### Fulla jove

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Color de l'anvers del limbe (4a fulla)                           | Verd amb zones antociàniques |
| Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Densos                       |
| Intensitat de la pigmentació antociànica                         | Mitjana                      |

#### Pàmpol

|  |                |
|--|----------------|
| Port                                   | Erecte         |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús  | Vermell        |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd i vermell |
| Color de la cara dorsal del nus        | Verd i vermell |
| Color de la cara ventral del nus       | Verd i vermell |

#### Circells

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Longitud dels circells (cm) | Molt curts |
|-----------------------------|------------|

#### Flor

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Òrgans sexuals                        | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Insecció de la primera inflorescència | A partir del cinquè nus   |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol   | 1,1 a 2 inflorescències   |

#### Fulla adulta

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Longitud del limbe (cm)   | Gran                      |
| Forma del limbe   | Pentagonal                |
| Nombre de lòbuls  | Cinc                      |
| Posició dels lòbuls del sinus peciolar                                  | Lleugerament oberta       |
| Relació L/A de les dents  | Mitjana                   |
| Longitud de les dents (cm)  | Mitjana                   |
| Forma de les dents  | Ambdós costats rectilinis |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Alta o molt baixa         |
| Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers     | Mitjans                   |
| Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers       | Escassos                  |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Moderadament més curta |
|--|------------------------|

### Raïm

|   |          |
|---|----------|
| Longitud del raïm sense peduncle (cm)         | Mitjana  |
| Densitat/Compacitat                           | Compacta |
| Longitud del peduncle del raïm principal (cm) | Curta    |

### Baia

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Longitud de la baia (cm)            | Mitjana                   |
| Forma de la baia                    | Globosa                   |
| Color de l'epidermis                | Negre blavós              |
| Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil       |
| Fermesa de la polpa                 | Tova o lleugerament ferma |
| Gust particular                     | Cap                       |
| Formació de llavors                 | Ben formades              |

### Fenologia

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Època del desborrament       | Mitjana |
| Època de l'inici del verolat | Mitjana |

### Acreditació bibliogràfica

| Objecte                      | Autors  | Títol                                   | Editorial   |
|------------------------------|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Escalona, J.M.;<br>Luna, J.M.; Bota,<br>J.; Garau, C.;<br>Martorell, A. | Varietats de vinya de les Illes Balears | Conselleria de Medi Ambient,<br>Agricultura i Pesca |