



### Descripció de la varietat

Trobada a la zona que va de Montuiri a Felanitx. Antigament es feia servir con a raïm de taula. De possible confusió entre els mateixos conreadors, atès que l'han identificat com a fogoneu, manto negro i callet, segons l'època.

### Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Sumitat/Pàmpol Jove

Obertura de la punta	Completament oberta
Presència de pèls tombats a la punta	Densos
Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Difusa
Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Absent o molt dèbil

#### Fulla jove

Color de l'anvers del limbe (4a fulla)	Verd
Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans-densos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

#### Pàmpol

Port	Erecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara dorsal del nus	Verd i vermell
Color de la cara ventral del nus	Verd i vermell

#### Circells

Longitud dels circells (cm)	Mitjans
-----------------------------	---------

#### Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Inserció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

#### Fulla adulta

Longitud del limbe (cm)	Mitjana
Forma del limbe	Cuneïforme
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls del sinus peciolar	Oberta a la meitat
Longitud de les dents (cm)	Curta
Relació L/A de les dents	Petita
Forma de les dents	Ambdós costats convexos
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absent o molt baixa
Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del peciòl en relació amb la nervadura central	Igual

#### Raïm

Longitud del raïm sense peduncle (cm)	Gran
---------------------------------------	------

Densitat/Compacitat	Mitjana
Longitud del peduncle del raïm principal (cm)	Curta

### Baia

Longitud de la baia (cm)	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Formació de llavors	Ben formades
Gust particular	Cap

### Fenologia

Època del desborrament	Primerenca
Època de l'inici del verolat	Primerenca

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca