



### Descripció de la varietat

Varietat autòctona negra, molt semblant a la varietat autoritzada callet, però els marcadors moleculars indiquen que són diferents. Trobada a la zona de Cas Concos. Encara que durant la prospecció de varietats es va collir com a manto negro o batista, uns estudis genètics recents demostren que és el parental originari de les varietats majoritàries callet, manto negro i gafarró.

### Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

### Observacions

Autoritzada la seva plantació a les Illes Balears mitjançant el BIOB núm. 199 de 24/11/2022.

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Sumitat

Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica	No rivetada
Pèls tombats	Escassos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats	Absent o molt dèbil

#### Fulla jove

Color del feix	Vermell rogenc clar
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absents o molt escassos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

#### Pàmpol

Port	Semiirecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd
Color de la cara ventral del nus	Verd

#### Circells

Llargària	Curts
-----------	-------

#### Fulla adulta

Mida del limbe	Mitjana
Forma del limbe	Orbicular
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls al sinus peciolar	Oberta a la meitat
Llargària de les dents	Mitjana
Relació llargària/amplada de les dents	Mitjana
Forma de les dents	Ambdós costats rectilinis
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absent o molt baixa
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Escassos
Llargària del peciòl en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

#### Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus

Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències
-------------------------------------	-------------------------

### Raïm

Mida del raïm	Gran
Compacitat	Solta
Llargària del peduncle del raïm principal	Curta

### Baia

Mida de la baia	Gran
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermeza de la polpa	Moderadament ferma
Gust particular	Cap
Formació de llavors	Ben formades

### Fenologia

Època del desborrament	Mitjana
Època de l'inici del verolat	Tardana

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca