



Descripció de la varietat

Actualment no es troba en el marc de prospecció fet a Mallorca; les accessions que hi ha en la col·lecció provenen del banc de germoplasma d'El Encín. Presenta un gran potencial aromàtic i una bona capa de color. Varietat minoritària autoritzada a les Illes Balears l'any 2016.

Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

Observacions

Autoritzada la seva plantació a les Illes Balears mitjançant el BIOB núm. 125 de 01/10/2016.

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat

| | |
|---|----------------------|
| Obertura de la punta | Completament oberta |
| Distribució de la pigmentació antociànica | No rivetada |
| Pèls tombats | Nuls o molt escassos |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats | Dèbil |

Fulla jove

| | |
|---|------------------------------|
| Color del feix | Verd amb zones antociàniques |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Escassos |
| Intensitat de la pigmentació antociànica | Dèbil |

Pàmpol

| | |
|--|----------------|
| Port | Semiirecte |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús | Verd i vermell |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd |
| Color de la cara dorsal del nus | Verd i vermell |
| Color de la cara ventral del nus | Verd |

Circells

| | |
|-----------|-------|
| Llargària | Curts |
|-----------|-------|

Fulla adulta

| | |
|---|-----------------------------------|
| Mida del limbe | Mitjana |
| Forma del limbe | Pentagonal |
| Nombre de lòbuls | Cinc |
| Posició dels lòbuls al sinus peciolar | Lleugerament oberta |
| Llargària de les dents | Curta |
| Relació llargària/amplada de les dents | Petita |
| Forma de les dents | Barreja de rectilínies i convexes |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Absent o molt baixa |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos |
| Pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos |
| Llargària del peciolar en relació amb la nervadura central | Moderadament més curta |

Flor

| | |
|---------------------------------------|---|
| Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Insecció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències |

Raïm

| | |
|---|----------|
| Mida del raïm | Mitjana |
| Compacitat | Compacta |
| Llargària del peduncle del raïm principal | Curta |

Baia

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Mida de la baia | Mitjana |
| Forma de la baia | Globosa |
| Color de l'epidermis | Negre blavós |
| Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil |
| Fermesa de la polpa | Tova o lleugerament ferma |
| Gust particular | Cap |
| Formació de llavors | Ben formades |

Fenologia

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Època del desborrament | Molt primerenca |
| Època de l'inici del verolat | Molt primerenca |

Aptituds agronòmiques

| | |
|------------------|--------|
| Producció (kg) | 2,65 |
| Nombre de raïms | 16,09 |
| Pes del raïm (g) | 164,06 |
| Vigor | Mitjà |

Qualitat del raïm

| | |
|-------------------------|-------|
| Acidesa total | 4,8 |
| Alcohol potencial | 12,1 |
| Potencial aromàtic | Mitjà |
| Intensitat de coloració | Alta |

Acreditació bibliogràfica

| Objecte | Autors | Títol | Editorial |
|------------------------------|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A. | Varietats de vinya de les Illes Balears | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca |