



Descripció de la varietat

Actualment no es troba en el marc de prospecció fet a Mallorca; les accessions que hi ha en la col·lecció provenen del banc de germoplasma d'El Encín. Presenta un gran potencial aromàtic i una bona capa de color. Varietat minoritària autoritzada a les Illes Balears l'any 2016.

Usos i coneixements

Consum humà
Vinya de vinificació

Observacions

Autoritzada la seva plantació a les Illes Balears mitjançant el BIOB núm. 125 de 01/10/2016.

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat/Pàmpol Jove

Obertura de la punta	Completament oberta
Presència de pèls tombats a la punta	Nuls o molt escassos
Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Nota vetada
Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Dèbil

Fulla jove

Color de l'anvers del limbe (4a fulla)	Verd amb zones antociàniques
Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Escassos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

Pàmpol

Port	Semiirecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd i vermell
Color de la cara ventral del nus	Verd

Circells

Longitud dels circells (cm)	Curts
-----------------------------	-------

Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Inserció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Fulla adulta

Longitud del limbe (cm)	Mitjana
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls del sinus peciolar	Lleugerament oberta
Longitud de les dents (cm)	Curta
Relació L/A de les dents	Petita
Forma de les dents	Barreja de rectilínies i convexes
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absent o molt baixa
Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

Raïm

Longitud del raïm sense peduncle (cm)	Mitjana
Densitat/Compactat	Compacta
Longitud del peduncle del raïm principal (cm)	Curta

Baia

Longitud de la baia (cm)	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Formació de llavors	Ben formades
Gust particular	Cap

Fenologia

Època del desborrament	Molt primerenca
Època de l'inici del verolat	Molt primerenca

Aptituds agronòmiques

Producció (kg)	2,65
Nombre de raïms	16,09
Pes del raïm (g)	164,06
Vigor	Mitjà

Qualitat del raïm

Acidesa total	4,8
Alcohol potencial	12,1
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Alta

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca