



Descripció de la varietat

Varietat citada al final del segle XIX, actualment no conreada a Mallorca. Les plantes que hi ha a la col·lecció provenen del banc de germoplasma d'El Encín.

Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

Observacions

Autoritzada la seva plantació a les Illes Balears mitjançant el BIOB núm. 199 de 24/11/2022.

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat

Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica	Rivetada
Pèls tombats	Escassos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats	Dèbil

Fulla jove

Color del feix	Verd amb zones antociàniques
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Densos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

Pàmpol

Port	Semiirecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd
Color de la cara ventral del nus	Verd

Circells

Llargària	Curts
-----------	-------

Fulla adulta

Mida del limbe	Gran
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls al sinus peciolar	Lleugerament superposada
Llargària de les dents	Mitjana
Relació llargària/amplada de les dents	Mitjana
Forma de les dents	Barreja de rectilínies i convexes
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Baixa o molt baixa
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans
Pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Escassos
Llargària del peciolar en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Raïm

Mida del raïm	Mitjana
Compacitat	Mitjana
Llargària del peduncle del raïm principal	Llarga

Baia

Mida de la baia	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Gust particular	Herbaci
Formació de llavors	Ben formades

Fenologia

Època del desborrament	Mitjana
Època de l'inici del verolat	Tardana

Aptituds agronòmiques

Producció (kg)	2,22
Nombre de raïms	7,67
Pes del raïm (g)	295,06
Vigor	Baix

Qualitat del raïm

Acidesa total	5,0
Alcohol potencial	12,5
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Mitjana

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca