Esperó de gall

Vinya - *Vitis vinifera*

Descripció de la varietat

Varietat citada al final del segle XIX, actualment no conreada a Mallorca. Les plantes que hi ha a la col·lecció provenen del banc de germoplasma d'El Encín.

Usos i coneixements

Consum humà
Vinya de vinificació

Observacions

Autoritzada la seva plantació a les Illes Balears mitjançant el BIOB núm. 199 de 24/11/2022.

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat	
Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica	Rivetada
Pèls tombats	Escassos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats	Dèbil

Fulla jove	
Color del feix	Verd amb zones antociàniques
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Densos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

Pàmpol	
Port	Semierecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd
Color de la cara ventral del nus	Verd

Circells	
Llargària	Curts

Fulla adulta	
Mida del limbe	Gran
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls al sinus peciolar	Lleugerament superposada
Llargària de les dents	Mitjana
Relació llargària/amplada de les dents	Mitjana
Forma de les dents	Barreja de rectílínies i convexes
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Alta o molt baixa
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans
Pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Escassos
Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

Flor	
Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Inseció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Raïm	
Mida del raïm	Mitjana
Compacitat	Mitjana
Llargària del peduncle del raïm principal	Llarga

Baia	
Mida de la baia	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Gust particular	Herbaci
Formació de llavors	Ben formades

Fenologia	
Època del desborrament	Mitjana
Època de l'inici del verolat	Tardana

Aptituds agronòmiques	
Producció (kg)	2,22
Nombre de raïms	7,67
Pes del raïm (g)	295,06
Vigor	Baix

Qualitat del raïm	
Acidesa total	5,0
Alcohol potencial	12,5
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Mitjana

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca