



### Descripció de la varietat

Varietat citada al final del segle XIX, actualment no conreada a Mallorca. Les plantes que hi ha a la col·lecció provenen del banc de germoplasma d'El Encín.

### Usos i coneixements

Consum humà  
Vinya de vinificació

### Observacions

Autoritzada la seva plantació a les Illes Balears mitjançant el BIOB núm. 199 de 24/11/2022.

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Sumitat/Pàmpol Jove

Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Difusa
Presència de pèls tombats a la punta	Escassos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Dèbil

#### Fulla jove

Color de l'anvers del limbe (4a fulla)	Verd amb zones antociàniques
Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Densos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

#### Pàmpol

Port	Semiirecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd
Color de la cara ventral del nus	Verd

#### Circells

Longitud dels circells (cm)	Curts
-----------------------------	-------

#### Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

#### Fulla adulta

Longitud del limbe (cm)	Gran
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls del sinus peciolar	Lleugerament superposada
Relació L/A de les dents	Mitjana
Longitud de les dents (cm)	Mitjana
Forma de les dents	Barreja de rectilínies i convexes
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Alta o molt baixa
Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjana
Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Escassos
Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

### Raïm

Longitud del raïm sense peduncle (cm)	Mitjana
Densitat/Compacitat	Mitjana
Longitud del peduncle del raïm principal (cm)	Llarga

### Baia

Longitud de la baia (cm)	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Gust particular	Herbaci
Formació de llavors	Ben formades

### Fenologia

Època del desborrament	Mitjana
Època de l'inici del verolat	Tardana

### Aptituds agronòmiques

Producció (kg)	2,22
Nombre de raïms	7,67
Pes del raïm (g)	295,06
Vigor	Baix

### Qualitat del raïm

Acidesa total	5,0
Alcohol potencial	12,5
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Mitjana

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca