



Descripció de la varietat

D'entre els enciams tradicionals eivissencs, la lletuga blava destaca pel vistós vermell fosc que cobreix l'extrem de les seues fulles. Es tracta d'una varietat de cicle estricte d'hivern tipus romana, de port gran. La fulla és el·líptica, de marges sencers i acabada en punta arrodonida. Conté un pigment anomenat antocianina, que li confereix resistència a les baixes temperatures. Normalment forma un cabdell tancat, afavorit pels dies freds d'hivern. Aguanta bé les gelades. Se sembra els mesos de tardor per collir-la com a molt tard en març. Amb l'arribada de la calor, puja a flor amb facilitat.

És una lletuga molt saborosa, tendra i un poc amarga al tast, que dona un toc de color a les ensalades. Aquesta varietat fa dècades va ser completament desplaçada per les varietats millorades. En l'actualitat, algunes productores de l'illa l'han recuperat per produir i comercialitzar en els circuits locals.

Origen de la varietat

Eivissa i Formentera. Aquesta varietat s'ha obtingut del CRF, que va prospectar la llavor a can Racó (Sant Llorenç de Balàfia) l'any 2009.

Usos i coneixements

Consum humà

La lletuga blava es consumeix fresca en enciam, que és com es denomina l'ensalada a les illes Pitiüses. També es fa servir en olles de guisat i llegum, així com en sopes. Les fulles de rebuig són aprofitades pels animals de corral (gallines, conills...)???

Observacions

El nivell d'antocianina en la plàntula varia segons les condicions d'estrès. La tonalitat augmenta amb temperatures extremes i condicions de sequera.

Caràcters morfològics de la varietat

Plàntula	
Pigmentació antocianica	Present
Planta	
Tipus de varietat	Romana
Diàmetre (cm)	36 ± 3
Formació del cabdell	Cabdell tancat
Cabdell: solapament de fulles	Fort
Forma del cabdell en secció longitudinal	El·líptica estreta
Fulla	
Nombre de divisions del limbe	Absents o molt baix
Forma	El·líptica
Gruixa	Mitjana
Tonalitat de color verd	Absent
Pigmentació antocianica	Present
Intensitat de color verd	Mitjana
Intensitat pigmentació antocianica	Forta
Superfície coberta per l'antocianina	Mitjana
Bollat	Mitjà
Intensitat ondulació dels marges	Dèbil
Densitat incisions a la zona apical	Absent
Profunditat de les incisions	Poca
Nervadura	No flabel·liforme
Inflorescència	
Precocitat pujada de flor	Primerenca
Llavor	

Color de la llavor	Negra
Pes de mil llavors (g)	1,00 ± 0,18