



### Descripció de la varietat

Varietat present només a la col·lecció. Prové del banc de germoplasma d'El Encín. Citada també a la Comunitat Valenciana.

### Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Sumitat

|   |                      |
|---|----------------------|
| Obertura de la punta                      | Completament oberta  |
| Distribució de la pigmentació antociànica | Absent               |
| Pèls tombats                              | Nuls o molt escassos |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats | Absent o molt dèbil  |

#### Fulla jove

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Color del feix  | Verd                    |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absents o molt escassos |
| Intensitat de la pigmentació antociànica                | Dèbil                   |

#### Pàmpol

|  |          |
|--|----------|
| Port                                   | Semiecte |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús  | Verd     |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd     |
| Color de la cara dorsal del nus        | Verd     |
| Color de la cara ventral del nus       | Verd     |

#### Circells

|           |       |
|-----------|-------|
| Llargària | Curts |
|-----------|-------|

#### Fulla adulta

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Mida del limbe  | Gran                      |
| Forma del limbe   | Pentagonal                |
| Nombre de lòbuls  | Cinc                      |
| Posició dels lòbuls al sinus peciolar                                   | Lleugerament superposada  |
| Llargària de les dents  | Llarga                    |
| Relació llargària/amplada de les dents                                  | Gran                      |
| Forma de les dents  | Ambdós costats rectilinis |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Absent o molt baixa       |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers                 | Absent o molt escassos    |
| Pèls drets sobre les nervadures principals del revers                   | Absent o molt escassos    |
| Llargària del peciòl en relació amb la nervadura central                | Moderadament més curta    |

#### Flor

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Òrgans sexuals                        | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Insecció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus  |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol   | 1,1 a 2 inflorescències   |

#### Raïm

|               |         |
|---------------|---------|
| Mida del raïm | Gran    |
| Compacitat    | Mitjana |

|   |       |
|---|-------|
| Llargària del peduncle del raïm principal | Curta |
|---|-------|

### Baia

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Mida de la baia                     | Mitjana                   |
| Forma de la baia                    | Globosa aplatada          |
| Color de l'epidermis                | Violeta vermellós fosc    |
| Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil       |
| Fermesa de la polpa                 | Tova o lleugerament ferma |
| Gust particular                     | Cap                       |
| Formació de llavors                 | Ben formades              |

### Fenologia

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Època del desborrament       | Primerenca |
| Època de l'inici del verolat | Primerenca |

### Acreditació bibliogràfica

| Objecte                      | Autors   | Títol                                   | Editorial   |
|------------------------------|--|---|---|
| Llibres i altres monografies | Escalona, J.M.;<br>Luna, J.M.; Bota,<br>J.; Garau, C.;<br>Martorell, A | Varietats de vinya de les Illes Balears | Conselleria de Medi Ambient,<br>Agricultura i Pesca |