



Descripció de la varietat

Varietat majoritària des de final del segle XIX fins al darrer quart del segle XX, molt cultivada sobretot a la zona de Felanitx. Actualment està en recessió. Identificada com a sinonímia de fogoneu francès.

Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat/Pàmpol Jove

Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Nota
Presència de pèls tombats a la punta	Nuls o molt escassos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Molt forta

Fulla jove

Color de l'anvers del limbe (4a fulla)	Vermell vi
Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absents o molt escassos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Molt forta

Pàmpol

Port	Semiecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara dorsal del nus	Vermell
Color de la cara ventral del nus	Verd i vermell

Circells

Longitud dels circells (cm)	Mitjans
-----------------------------	---------

Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Fulla adulta

Longitud del limbe (cm)	Gran
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls del sinus peciolar	Lleugerament oberta
Relació L/A de les dents	Petita
Longitud de les dents (cm)	Curta
Forma de les dents	Ambdós costats convexos
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Màxima
Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central	Més curta

Raïm

Longitud del raïm sense peduncle (cm)	Mitjana
---------------------------------------	---------

Densitat/Compacitat	Compacta
Longitud del peduncle del raïm principal (cm)	Curta

Baia

Longitud de la baia (cm)	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Gust particular	Cap
Formació de llavors	Ben formades

Fenologia

Època del desborrament	Mitjana
Època de l'inici del verolat	Mitjana

Aptituds agronòmiques

Producció (kg)	2,42
Nombre de raïms	14,75
Pes del raïm (g)	161,44
Vigor	Mitjà

Qualitat del raïm

Acidesa total	5,1
Alcohol potencial	9,5
Potencial aromàtic	Baix
Intensitat de coloració	Alta

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca