



### Descripció de la varietat

Varietat autòctona negra, prospectada a la zona de Cas Concos com a fogoneu per la seva gran semblança. Tanmateix, els marcadors moleculars indiquen que són diferents, cosa que converteix la varietat mallorquina en una varietat desconeguda fins ara.

### Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Sumitat

Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica	No rivetada
Pèls tombats	Nuls o molt escassos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats	Molt forta

#### Fulla jove

Color del feix	Vermell vi
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absents o molt escassos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Molt forta

#### Pàmpol

Port	Semiirecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara dorsal del nus	Vermell
Color de la cara ventral del nus	Verd i vermell

#### Circells

Llargària	Mitjans
-----------	---------

#### Fulla adulta

Mida del limbe	Mitjana
Forma del limbe	Cuneiforme
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls al sinus peciolar	Oberta a la meitat
Llargària de les dents	Curta
Relació llargària/amplada de les dents	Petita
Forma de les dents	Ambdós costats convexos
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Mitjana
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del peciolar en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

#### Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

#### Raïm

Mida del raïm	Gran
---------------	------

Compacitat	Solta
Llargària del peduncle del raïm principal	Llarga

### Baia

Mida de la baia	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Gust particular	Cap
Formació de llavors	Ben formades

### Fenologia

Època del desborrament	Mitjana
Època de l'inici del verolat	Mitjana

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca