



Descripció de la varietat

Varietat no descrita anteriorment. Molecularment identificada dins del mateix grup que la varietat callet negrella. Fou collida a la zona de la Colònia de Sant Pere a partir d'un únic conreador.

Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat

Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica	Rivetada
Pèls tombats	Escassos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats	Forta

Fulla jove

Color del feix	Verd amb zones antociàniques
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absents o molt escassos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Mitjana

Pàmpol

Port	Horitzontal
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd i vermell
Color de la cara ventral del nus	Verd

Circells

Llargària	Mitjans
-----------	---------

Fulla adulta

Mida del limbe	Mitjana
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls al sinus peciolar	Oberta a la meitat
Llargària de les dents	Mitjana
Relació llargària/amplada de les dents	Mitjana
Forma de les dents	Barreja de rectilínies i convexes
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Alta
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del peciolar en relació amb la nervadura central	Igual

Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Raïm

Mida del raïm	Molt gran
---------------	-----------

Compacitat	Compacta
Llargària del peduncle del raïm principal	Curta

Baia

Mida de la baia	Gran
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Gust particular	Cap
Formació de llavors	Ben formades

Fenologia

Època del desborrament	Molt primerenca
Època de l'inici del verolat	Tardana

Aptituds agronòmiques

Producció (kg)	5,23
Nombre de raïms	15,33
Pes del raïm (g)	328,60
Vigor	Mitjà

Qualitat del raïm

Acidesa total	4,6
Alcohol potencial	10,5
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Mitjana

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca