



### Descripció de la varietat

Varietat no descrita anteriorment. Molecularment identificada dins del mateix grup que la varietat callet negrella. Fou collida a la zona de la Colònia de Sant Pere a partir d'un únic conreador.

### Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Sumitat

Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica	Rivetada
Pèls tombats	Escassos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats	Forta

#### Fulla jove

Color del feix	Verd amb zones antociàniques
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absents o molt escassos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Mitjana

#### Pàmpol

Port	Horitzontal
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd i vermell
Color de la cara ventral del nus	Verd

#### Circells

Llargària	Mitjans
-----------	---------

#### Fulla adulta

Mida del limbe	Mitjana
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls al sinus peciolar	Oberta a la meitat
Llargària de les dents	Mitjana
Relació llargària/amplada de les dents	Mitjana
Forma de les dents	Barreja de rectilínies i convexes
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Alta
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del peciolar en relació amb la nervadura central	Igual

#### Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

#### Raïm

Mida del raïm	Molt gran
---------------	-----------

Compacitat	Compacta
Llargària del peduncle del raïm principal	Curta

### Baia

Mida de la baia	Gran
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Gust particular	Cap
Formació de llavors	Ben formades

### Fenologia

Època del desborrament	Molt primerenca
Època de l'inici del verolat	Tardana

### Aptituds agronòmiques

Producció (kg)	5,23
Nombre de raïms	15,33
Pes del raïm (g)	328,60
Vigor	Mitjà

### Qualitat del raïm

Acidesa total	4,6
Alcohol potencial	10,5
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Mitjana

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca