



Origen de la varietat

Eivissa.

Usos i coneixements

Consum humà

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat/Pàmpol Jove

Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Notable
Presència de pèls tombats a la punta	Escassos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Absent o molt dèbil
Presència de pèls erectes a la punta	Absents o molt escassos

Fulla jove

Color de l'anvers del limbe (4a fulla)	Verd amb zones antociàniques
Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Densos
Densitat pèls erectes entre les nervadures principals del revers	Mitjà
Intensitat de la pigmentació antociànica	Absent o molt dèbil

Pàmpol

Port	Semiecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd i vermell
Color de la cara ventral del nus	Verd
Pèls erectes sobre l'entrenús	Absents o molt escassos

Circells

Longitud dels circells (cm)	Mitjans
-----------------------------	---------

Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Fulla adulta

Longitud del limbe (cm)	Mitjana
Forma del limbe	Orbicular
Rugositat de la Fulla	Nul o molt dèbil
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls del sinus peciolar	Tancada
Profunditat sinus laterals	Mitjà
Disposició dels lòbuls dels sinus laterals superiors	Tancada
Relació L/A de les dents	Gran
Longitud de les dents (cm)	Mitjana
Forma de les dents	Ambdós costats convexos
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absent o molt baixa
Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Densos

Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

Raïm

Longitud del raïm sense peduncle (cm)	Mitjana
Densitat/Compacitat	Mitjana
Longitud del peduncle del raïm principal (cm)	Curta

Baia

Longitud de la baia (cm)	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Verd grogós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Moderadament ferma
Gust particular	Cap
Formació de llavors	Ben formades

Fenologia

Època del desbortament	Mitjana
Època de l'inici del verolat	Mitjana

Qualitat del raïm

Alcohol potencial	13,9 ± 0,07
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Mitjana

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Diccionari	Favà Agud, X.	Diccionari dels noms de ceps i raïms. L'ampelonímia catalana	Institut d'Estudis Catalans
	Calafat, P.	Vinyòvol. Vocabulari pagès de la vinya i el vi.	Documenta Balear