



Descripció de la varietat

Varietat provinent del banc de germoplasma d'El Encín, tot i que també s'ha trobat a la zona de Consell. Els resultats d'estudis genètics recents assenyalen que és idèntica a la varietat mandó i a la sabater prospectades a les zones de Montuiri i Porreres.

Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat

Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica	No rivetada
Pèls tombats	Densos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats	Dèbil

Fulla jove

Color del feix	Verd amb zones antociàniques
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Densos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

Pàmpol

Port	Semiirecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd
Color de la cara ventral del nus	Verd

Circells

Llargària	Curts
-----------	-------

Fulla adulta

Mida del limbe	Gran
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls al sinus peciolar	Lleugerament oberta
Llargària de les dents	Mitjana
Relació llargària/amplada de les dents	Mitjana
Forma de les dents	Barreja de rectilínies i convexes
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absència o molt baixa
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans
Pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Mitjans
Llargària del peciolar en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Raïm

Mida del raïm	Mitjana
---------------	---------

Compacitat	Compacta
Llargària del peduncle del raïm principal	Molt curta

Baia

Mida de la baia	Mitjana
Forma de la baia	Globosa aplatada
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Gust particular	Cap
Formació de llavors	Ben formades

Fenologia

Època del desborrament	Tardana
Època de l'inici del verolat	Tardana

Aptituds agronòmiques

Producció (kg)	1,71
Nombre de raïms	8,08
Pes del raïm (g)	234,50
Vigor	Mitjà

Qualitat del raïm

Acidesa total	5,1
Alcohol potencial	12,2
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Alta

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca