



Usos i coneixements

Consum animal i humà

Caràcters morfològics de la varietat

Cultiu	
Època de sembra	Hivern
Dies per l'espigat	Mitjana (Cicle de 99-129 dies)

Planta	
Sensibilitat al fotoperíode	Alta
Hàbit de creixement	Intermig
Alçada de la planta (cm)	Mitjana (91,3 ± 8,4)
Pigmentació de la tija (immadura)	Porpra només a la part basal

Tija	
Vellositat de la beina inferior	Absent
Intensitat pigmentació antociànica de aurícules de la banderola	Absent o molt dèbil
Pigmentació de la aurícula	Verda

Espiga	
Llargària de l'espiga (cm)	Curta (5,42 ± 0,7)
Densitat de l'espiga	Laxa
Nombre de carreres	Sis carreres, arestes llargues a les flors laterals
Nombre d'espiguetes per espiga	Mitjà (35,5)

Arestes	
Llargària de les arestes (cm)	Llargues (14,46 ± 1,8)
Forma de les arestes de la lemma	Arestes llargues
Rugositat de les arestes	Intermitja (petites barbes a la meitat superior)
Llargària de la gluma més l'aresta en relació al gra	Tan llarga com el gra
Intensitat coloració antociànica de les puntes de les barbes	Absent o molt dèbil

Llavor	
Color de la llavor	Blanc
Color glumma	Blanc
Color de la lemma	Blanca a marró
Cobertes de la llavor	Llavor semicoberta
Tipus de pelositat de la raquilla de la llavor	Pels curts
Vellositat del solc ventral del gra	Present
Pes 500 llavors (g)	23 g
Llargària de la llavor (mm)	Mitjana (11,82 ± 1,3)
Amplada de la llavor (mm)	Ampla (3,85 ± 0,14)
Relació llargària/amplada	Mitjana
Tipus de vellositat de la raquilla del gra	Pels curts