



### Origen de la varietat

Prospectada al torren de Coanegra, a Santa Maria, a un antic hort dut per les monges s'hi han trobat entre d'altres varietats ben antigues, aquesta accessió fins ara desconeguda.

### Usos i coneixements

Consum humà

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Sumitat

Obertura de la punta	Molt oberta
Distribució de la pigmentació antociànica	No rivetada
Pèls tombats	Mitjans
Pigmentació antociànica dels pèls tombats	Absent o molt dèbil
Pèls erectes de la punta	Mitjà

#### Fulla jove

Color del feix	Vermell rogenc clar
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans
Pèls erectes sobre les nervadures del limbe	Mitjà
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

#### Pàmpol

Port	Semiirecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd
Color de la cara ventral del nus	Verd i vermell
Pèls erectes sobre l'entrenús	Absents o molt escassos

#### Circells

Llargària	Mitjans
-----------	---------

#### Fulla adulta

Mida del limbe	Mitjana
Forma del limbe	Orbicular
Rugositat de la Fulla	Dèbil
Nombre de lòbuls	Cinc
Profunditat sinus laterals	Mitjà
Posició dels lòbuls al sinus peciolar	Lleugerament superposada
Postura dels lòbuls al sinus foliar	Lleugerament superposada
Llargària de les dents	Mitjana
Relació llargària/amplada de les dents	Mitjana
Forma de les dents	Ambdós costats convexos
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Mitjana
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Escassos
Pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del peciol en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

#### Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
----------------	---

Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

### Raïm

Mida del raïm	Mitjana
Compacitat	Compacta
Llargària del peduncle del raïm principal	Llarga

### Baia

Mida de la baia	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Verd grogós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Moderadament ferma
Gust particular	Cap
Formació de llavors	Ben formades

### Fenologia

Època del desborrament	Mitjana
Època de l'inici del verolat	Mitjana

### Qualitat del raïm

Acidesa total	9.6 ± 0.14
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Mitjana