



Descripció de la varietat

Actualment recuperada i autoritzada a les Illes Balears des de 2011, amb molt bones perspectives de difusió. També coneguda com a giró blanc. Es cultiva a les zones de Felanitx i Manacor a causa del bon grau alcohòlic i l'acidesa.

Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

Observacions

Autoritzada la seva plantació a les Illes Balears mitjançant el BIOB núm. 81 de 02/06/2011.

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat

| | |
|---|---------------------|
| Obertura de la punta | Completament oberta |
| Distribució de la pigmentació antociànica | Rivetada |
| Pèls tombats | Escassos |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats | Dèbil |

Fulla jove

| | |
|---|-------------------------|
| Color del feix | Vermell rogenc clar |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absents o molt escassos |
| Intensitat de la pigmentació antociànica | Dèbil |

Pàmpol

| | |
|--|-----------|
| Port | Semirecte |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús | Verd |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd |
| Color de la cara dorsal del nus | Verd |
| Color de la cara ventral del nus | Verd |

Circells

| | |
|-----------|--------|
| Llargària | Llargs |
|-----------|--------|

Fulla adulta

| | |
|---|---------------------------|
| Mida del limbe | Gran |
| Forma del limbe | Pentagonal |
| Nombre de lòbuls | Cinc |
| Posició dels lòbuls al sinus peciolar | Oberta a la meitat |
| Llargària de les dents | Mitjana |
| Relació llargària/amplada de les dents | Mitjana |
| Forma de les dents | Ambdós costats rectilinis |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Absent o molt baixa |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos |
| Pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Escassos |
| Llargària del peciolar en relació amb la nervadura central | Igual |

Flor

| | |
|---------------------------------------|---|
| Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Insecció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències |

Raïm

| | |
|---|---------|
| Mida del raïm | Gran |
| Compacitat | Solta |
| Llargària del peduncle del raïm principal | Mitjana |

Baia

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Mida de la baia | Mitjana |
| Forma de la baia | Globosa |
| Color de l'epidermis | Vermell grisós |
| Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil |
| Fermesa de la polpa | Tova o lleugerament ferma |
| Gust particular | Cap |
| Formació de llavors | Ben formades |

Fenologia

| | |
|------------------------------|---------|
| Època del desborrament | Mitjana |
| Època de l'inici del verolat | Mitjana |

Aptituds agronòmiques

| | |
|------------------|--------|
| Producció (kg) | 3,30 |
| Nombre de raïms | 12,60 |
| Pes del raïm (g) | 247,53 |
| Vigor | Mitjà |

Qualitat del raïm

| | |
|-------------------------|-------|
| Acidesa total | 5,2 |
| Alcohol potencial | 14,4 |
| Potencial aromàtic | Mitjà |
| Intensitat de coloració | Alta |

Acreditació bibliogràfica

| Objecte | Autors | Títol | Editorial |
|------------------------------|--|---|--|
| Llibres i altres monografies | Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A. | Varietats de vinya de les Illes Balears | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca |