



### Descripció de la varietat

Varietat minoritària autoritzada a les Illes Balears des de 2011. Recuperada a partir de quatre ceps residuals provinents d'una vinya de Selva, i reproduïda posteriorment a la zona de Consell. Coincideix amb la varietat que hi ha al banc de germoplasma d'El Encín.

### Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

### Observacions

Autoritzada la seva plantació a les Illes Balears mitjançant el BIOB núm. 81 de 02/06/2011.

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Sumitat

|   |                     |
|---|---------------------|
| Obertura de la punta                      | Completament oberta |
| Distribució de la pigmentació antociànica | Absent              |
| Pèls tombats                              | Densos              |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats | Dèbil               |

#### Fulla jove

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Color del feix  | Verd amb zones antociàniques |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Densos                       |
| Intensitat de la pigmentació antociànica                | Dèbil                        |

#### Pàmpol

|  |                |
|--|----------------|
| Port                                   | Semiirecte     |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús  | Verd i vermell |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd           |
| Color de la cara dorsal del nus        | Verd i vermell |
| Color de la cara ventral del nus       | Verd           |

#### Circells

|           |         |
|-----------|---------|
| Llargària | Mitjans |
|-----------|---------|

#### Fulla adulta

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Mida del limbe  | Gran                      |
| Forma del limbe   | Pentagonal                |
| Nombre de lòbuls  | Cinc                      |
| Posició dels lòbuls al sinus peciolar                                   | Oberta a la meitat        |
| Llargària de les dents  | Llarga                    |
| Relació llargària/amplada de les dents                                  | Gran                      |
| Forma de les dents  | Ambdós costats rectilinis |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Alta o molt baixa         |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers                 | Densos                    |
| Pèls drets sobre les nervadures principals del revers                   | Mitjans                   |
| Llargària del peciòl en relació amb la nervadura central                | Igual                     |

#### Flor

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Òrgans sexuals                        | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Insecció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus  |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol   | 1,1 a 2 inflorescències   |

### Raïm

|   |         |
|---|---------|
| Mida del raïm                             | Mitjana |
| Compacitat                                | Mitjana |
| Llargària del peduncle del raïm principal | Mitjana |

### Baia

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Mida de la baia                     | Mitjana                   |
| Forma de la baia                    | Globosa                   |
| Color de l'epidermis                | Negre blavós              |
| Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil       |
| Fermesa de la polpa                 | Tova o lleugerament ferma |
| Gust particular                     | Cap                       |
| Formació de llavors                 | Ben formades              |

### Fenologia

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Època del desborrament       | Tardana |
| Època de l'inici del verolat | Tardana |

### Aptituds agronòmiques

|                  |       |
|------------------|-------|
| Producció (kg)   | 0,97  |
| Nombre de raïms  | 10,33 |
| Pes del raïm (g) | 97,57 |
| Vigor            | Mitjà |

### Qualitat del raïm

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Acidesa total           | 4,7   |
| Alcohol potencial       | 12,0  |
| Potencial aromàtic      | Mitjà |
| Intensitat de coloració | Alta  |

### Acreditació bibliogràfica

| Objecte                      | Autors  | Títol                                   | Editorial   |
|------------------------------|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Escalona, J.M.;<br>Luna, J.M.; Bota,<br>J.; Garau, C.;<br>Martorell, A. | Varietats de vinya de les Illes Balears | Conselleria de Medi Ambient,<br>Agricultura i Pesca |