



### Descripció de la varietat

Varietat minoritària autoritzada a les Illes Balears des de 2011. Recuperada a partir de quatre ceps residuals provinents d'una vinya de Selva, i reproduïda posteriorment a la zona de Consell. Coincideix amb la varietat que hi ha al banc de germoplasma d'El Encín.

### Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

### Observacions

Autoritzada la seva plantació a les Illes Balears mitjançant el BIOB núm. 81 de 02/06/2011.

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Sumitat

Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica	Absent
Pèls tombats	Densos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats	Dèbil

#### Fulla jove

Color del feix	Verd amb zones antociàniques
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Densos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

#### Pàmpol

Port	Semiirecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd i vermell
Color de la cara ventral del nus	Verd

#### Circells

Llargària	Mitjans
-----------	---------

#### Fulla adulta

Mida del limbe	Gran
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls al sinus peciolar	Oberta a la meitat
Llargària de les dents	Llarga
Relació llargària/amplada de les dents	Gran
Forma de les dents	Ambdós costats rectilinis
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Alta o molt baixa
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Densos
Pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Mitjans
Llargària del peciolar en relació amb la nervadura central	Igual

#### Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

### Raïm

Mida del raïm	Mitjana
Compacitat	Mitjana
Llargària del peduncle del raïm principal	Mitjana

### Baia

Mida de la baia	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Gust particular	Cap
Formació de llavors	Ben formades

### Fenologia

Època del desborrament	Tardana
Època de l'inici del verolat	Tardana

### Aptituds agronòmiques

Producció (kg)	0,97
Nombre de raïms	10,33
Pes del raïm (g)	97,57
Vigor	Mitjà

### Qualitat del raïm

Acidesa total	4,7
Alcohol potencial	12,0
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Alta

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca